千金寶要

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



千金寶要

孫思邈集

本館據平津館叢書本排印初編各叢書僅有此本

重刻千金寶要序

千金寶要十七卷。附論。及千金須知爲十八卷。宋宣和時。郭學士思。從孫徵君思邈所撰千金方。擇要刻石華州公署。自明正統景泰間。俱有木石刻本。至隆慶六年。秦王守中復刊石燿州眞人祠。四庫書未及收錄。余遊關中。得其搨本。藏笈中。按家徵君生於後周。卒於唐永淳之代。葉夢得避暑錄話。稱其作千金前方時。已百餘歲。後三十年。作千金翼。段成式酉陽雜俎。則謂昆明池龍宮。有仙方三千首。徵君以救龍得之。因上帝不許妄傳。復著千金方三十卷。每卷入一方。千金方本與千金翼方。爲二書。是以舊唐書本傳。止載千金方三十卷。晁公武陳振孫書目。則云各三十卷。今俗本千金翼方九十三卷。不知何人更其次第。千金前方竟不可別。此宣和時擇要本。當從前方錄出者。龍宮仙方在其內。眞世間祕異之書。不可不廣其傳以公同志。書中謂今俗稱豆瘡爲小兒丹毒。又有反花瘡。元人奇效良方。始謂之痘疹。可證俗人謂此疾出於近代者非也。縊死人可救。落水死人經一宿猶可活。倉卒間不知其方。書備其術。尤爲濟人之仁術。世之從政者。不師蓋公獄市勿擾之言。惟株累鍛鍊之是務。置一切積貯水利農田學校利益於人之事於不問。以致損傷元氣。感召災殃。誠不如尋覽方書。胸中常有活人之念。爲善最樂。在此不在彼矣。嘉慶十二年七月三日。　賜進士及第授通奉大夫。署山東布政使。督糧道。加四級。陽湖孫星衍撰

於藩署之濟性堂.

刻千金寶要序

千金寶要者。宋徽猷閣直學士郭思。按唐孫眞人先生所集千金方中。纂要者也。宣和六年。思曾刻石于華州公署。我明正統八年。華州知州劉整重刻。景泰六年。和州楊勝賢。以石刻。冬月不便摹印。易刊木板。往年春。予得之。喜其方之簡便。藥之近易。醫不煩而取效速。信有切于人之實用。迺珍如拱璧。不容自祕。已命壽之梓矣。竊惟寶要纂自眞人千金方中。天下之遊耀州眞人洞者。歲無虛日。日無虛時。顧獨不立石于眞人洞前。非所以廣其傳也。因刻于洞前云。隆慶六年歲在壬申春三月上吉。秦王守中識。

千金寶要目錄

婦人第一
小兒第二
中毒第三
飲食中毒第四
解百藥毒第五
蛇蝎等毒第六
喉痺金瘡第七
瘡疽癰腫第八
霍亂吐瀉第九
虎犬馬傷第十　針折入肉附
舌耳心目等大小便第十一
中風大風水氣第十二

瘧痢癥等第十三
頭風吐逆第十四
疫瘴濁淋第十五
頭面手足瘰癧瘡漏第十六
痔第十七
論
千金須知

千金寶要卷之一

唐 孫思邈集

婦人第一

妊娠難產燒車軏脂內酒中服亦治腹中痛并欬嗽

妊娠忽苦心腹痛燒鹽令赤熱三指撮酒服之立產

又方吞槐子二七箇

又方蒐絲子或車前子以酒或米汁服方寸匕即生

又方水或酒服家中黑塵

子死腹中及小難橫生倒生難生者半夏白斂各二兩末之服方寸匕亦可加代赭瞿麥各二兩佳小難一服橫生二服倒生三服子死四服

又方榆白皮細切㕮三升服之

子死衣不出上搶心者急取蟻垤土三升熬之令熱囊盛熨心良

又方末竈突中墨三指撮水或酒服之

乳無汁者。土瓜根末之。一服半錢匕。日三。

衣不出。及橫生逆生者。小麥小豆煮濃汁飲。立出。

產三日不出者。燒大刀鐶。以酒一盞沃之。頓服。

又方。燒藥杵令赤。內酒中飲之。救死不分晚者。

產乳暈絕者。製了半夏一兩。末之。丸如大豆。內鼻孔中。愈。

又方。神麯末。水服方寸匕。

又方。舍醲醋。噀面。

子死腹中。牛屎塗母腹上。立出。

胎死腹中。服水銀三兩立出。

未足月而胎死者。以苦酒濃煮大豆。一服一升。死胎立出。

妊娠時疾。子不下。竈中黃土水。或酒。或泔清調。塗臍方寸。乾再上。

又方。酒服車轄脂。

又方。茈白一把。水三升。煮熟。食茈令盡。亦安胎。胎死者卽出。

妊娠中蠱。燒敗皷皮。酒服方寸匕。

妊娠傷寒。葛白十莖。生薑二兩。切。水三升。煮去半。服取汗。

產後血不盡。煩悶。搗生藕取汁。飲二升。良。

產後腹脹痛者。煮黍粘根爲飲。一服卽愈。

五色帶下者。煮甑帶汁。服一盃。良。

月水不斷。灸內踝下。白肉際。青脉上。隨年壯。

又方。服地黃酒。良。或大豆服亦佳。

月水不利。及無子。灸四滿三十壯。穴在丹田兩邊。相去各一寸半。丹田在臍下二寸。

漏下。積年困篤者。取鵲重巢。燒灰。末之。服方寸匕。日三服。三十日愈。重巢者。連二年鵲產其上者是。

產後。月水往來多少不定。或不通。痛。小腹急。腰身重。白馬尿一升服之。良。

逆生橫生者。竈下黃土三指撮。酒服。立出。

小兒第二

凡小兒生下不啼者。取兒臍帶向身。卻捋之。仍呵之百度。亦可以葛白鞭之。

浴新生兒。以猪膽一箇。汁入湯中。令兒無瘡疥。

小兒生輒死者。便覷兒口中懸癰前。上腭有胞者。急以指摘取頭。決令潰去血。勿令血入咽。入咽卽殺兒。

愼之。

小兒臍不合。燒蜂房灰末傅之。

小兒中風口噤。雀屎如麻子丸之。飲下卽愈。

兒生三日內。朱蜜多則生陰癇。朱蜜三日內通得用三豆許。朱蜜後。與牛黃。亦三豆許。除兒百病。牛黃後。可與米飲。研米作厚飲。如豆大。與兒三豆許。止日二七日後方哺乳。

小兒解顱。熬蛇脫皮末之。和猪頰車中髓。傅頂上。日三四。

小兒肚皮卒然靑黑。以酒和胡粉傅上。若不急治。須臾便死。

又方。灸臍左右上下各半寸。並鳩尾骨下一寸。凡五處。各三壯。

小兒暴脹欲死。半夏隨多少。微炮之爲末。酒丸如粟米大。日三。

小兒丹毒。搗愼火草。絞取汁塗之。

小兒赤遊腫。若偏身入心腹。殺人。搗伏龍肝爲末。以雞子白和。傅之。乾。易之。

又方。白豆末。水和。傅之。勿令乾。

又身赤腫起者。熬米粉令黑。以唾和。傅之。

小兒傷寒發黃。搗土瓜根汁。三合服之。

又方。搗青麥汁服之。

又方。搗韭根汁。澄清。滴兒鼻中。如大豆許。卽出黃水。差。

小兒霍亂。研尿滓。乳上服之。

又方。牛涎。灌口中一合。

小兒客忤。呑麝香大豆許。立愈。

又方。以母月衣覆兒上。大良。

又方。取牛鼻津服之。

又方。取牛口沫。傅乳頭。飲之。

又方。取熱馬屎一丸。絞取汁。飲兒。下便愈。亦治嗢啼面青腹強者。

小兒誤呑針。取磁石如棗核大。呑之。或含之。其針立出。

誤呑鐵物等。艾蒿一把。剉。以水五升。煮取一升半。服之。卽下。

誤呑髮亂髮燒灰。酒服一錢。

呑錢。艾蒿五兩。以水五升。煮取一升。頓服之。卽下。

又方。末火炭。酒服方寸匕。水服亦得。

又方。服蜜二升。卽出。

吞金銀釵鐶。白糖二斤。一頓。漸漸食之。多食益佳。

又方。吞水銀一兩。再服之。

吞鐶及指彊。燒鴈毛二七箇。末服。鵝毛亦得。

吞釵。暴韭令萎。蒸熟。勿切。食一束卽出。或生麥葉筋縷。如韭法。皆可用。但力意多食自消。

吞銅鐵而哽。燒銅弩牙令赤。內酒中飲之。立愈。

吞釘針及箭簇等。但多食脂肥肉令飽。自裏出。

吞針。取懸針磁石末。飲服方寸匕。卽下。

小兒尿竈丹。初起。兩股八臍。陰頭皆赤者。水二升。桑皮切二升。煮取汁。浴之。良。

又方。燒李根爲灰。以田中流水和。傅之。良。

小兒朱田火丹。一日夜卽成瘡。先從背漸徧身。如棗大赤者。濃煮棘根洗之。已成瘡者。赤小豆末傅之。

小兒野火丹。徧身皆赤者。用油塗之。

小兒茱萸丹。初起背。徧身如緞。一宿成瘡者。煮赤小豆作末。以傅之。

小兒廢竈火丹。初起足趺。正赤色者。以棗根煮汁。沐浴五六度。自愈。

小兒風瘖隱疹心迷悶巴豆二兩以水七升取煮三升故帛染汁拭之大人加減用之。

又方。礬石二兩末之酒三升清令消帛染拭病上。

又方。吳茱萸一升酒五斤煮取一升半帛拭病上。

小兒隱疹入腹體強舌乾蕪菁子末酒服方寸匕日三。

又方。蠶沙二升水二升煮去渣洗之。

又方。鹽湯洗了以蓼子挼傅之。

又方。車前子作末傅之。

諸丹毒渠中藻菜細切熟搗傅丹上厚三分乾易之。

又方。芸臺菜熟搗厚封之隨手卽消如餘熱氣未愈但三日內封之使醒醒好差止。

五色油丹縛母猪枕頭臥之良。

又方。牛屎塗之乾則易之。

赤流腫搗火麻子水和傅之。

又方。以羊脂煎了磨之赤黑丹起徧身者殺人。

小兒瘡初起慓漿似火瘡熟搗桃仁以麝脂和傅之亦治徧身赤腫。

小兒身體頭面生瘡。榆白皮隨多少。暴令乾。末之。醋和。塗緜。以傅瘡上。蟲自出。

小兒丹毒。馬齒莧一握。搗取汁。飲之。以滓傅之。

又方。搗赤小豆五合。水和。取汁飲之。一合。良。滓塗五心。

又方。濃煮大豆汁塗之。良。差。亦無瘢痕。

又方。臘月猪脂。和釜下土。傅之。乾。則易之。

小兒五色丹。搗蒲萄葉。傅之。

又方。薤白一把。豉一升。以水三升。煮取二升。分三服。

又方。柏葉一升。麻子末一升。以水五升。煮三沸。百日兒。每服三合。

又方。搗石榴汁服之。

又方。亂髮灰、鹿角灰等分。三歲兒。以水和服三錢匕。日二。

小兒赤白痢。單服生地黃汁一合。

小兒熱痢。煮木瓜葉飲之。

小兒冷痢。蓼菜搗汁。量大小飲之。一作芥菜。

又方。搗蒜傅兩足下。

小兒暴痢。赤小豆末。酒和。塗足下。日三。油和亦得。

小兒蠱毒痢。藍青汁一升二合。分爲四服。飲之。

小兒渴痢。搗木瓜汁飲之。

小兒頭不生髮。楸葉搗汁。傅之。

小兒瘻瘡。冢中石灰。厚傅之。

小兒浸淫瘡。以竈下黃土、髮灰等分。末之。以猪脂和。傅之。

小兒疥瘡。以臭酥。和胡粉。傅之。

小兒濕癬。煎馬尿洗。

小兒斑瘡入眼。浮萍陰乾爲末。以生羊子肝半箇。入盞內。以杖子刺碎。沒水半合。絞取肝汁。食後調下。不甚者一服。已傷目者。十服見效。大人亦可用。

小兒赤熱腫目。川大黃白礬朴硝等分爲末。冷水調。作掩子。貼目上。

小兒重舌。腫起舌下。以朴硝研水。敷咽喉外。其內用成塊者含。涎出乃平。

又方。地蜱蟲和薄荷研汁帛包。蘸舌下。腫起重舌。

極證。用指去爪。先于舌下筋上擦至根。漸深深擦。如此三次。又用指蘸水。取項後燕窠小坑中筋。目上趕

下至小窟深深擦入三次小兒若飲乳勝前則病去矣

小兒禿瘡及惡瘡以苦練皮燒灰以猪脂調傅大人惡瘡亦可用

小兒卵腫偏墜防風牡丹皮等分爲末每服二錢匕溫酒調服鹽湯亦可

小兒卒客忤以竈中黃土蚯蚓糞等分研細水調塗兒頭上及五心良

又方米粉鹽等分炒變色腹上摩之

小兒頭瘡經年不差者取屋塵末和油瓶下滓以皁角湯洗傅之

小兒頭瘡胡粉一兩黃連二兩末之洗瘡去痂拭乾傅之卽差再發再傅之

禿瘡葶藶子細末先洗傅之

小兒惡瘡熬豉令黃末之傅瘡上不過三傅愈

小兒手足及身腫者以小便溫煖漬之卽愈

又方巴豆五十枚去心皮以水二升煑取一升以緜內湯中拭病上隨手消并治隱疹

小兒脫肛灸頂上旋毛中三壯卽入

又方灸尾翠骨三壯

又方灸臍中隨年壯

小兒疳瘡嚼麻子傅之日六七度。

小兒濕瘡濃煮地榆汁洗浴日兩度。

小兒尿血燒鵲巢灰井花水服之亦可治尿牀。

小兒解顱猪牙頰車髓傅顱上差。

小兒風瘙隱疹牛膝末酒服方寸匕漏瘡多年不差搗末傅之亦治骨疽癲疾瘰癧絕妙。

小兒胎寒嘔啼驚癎腹脹不嗜食大便青黃幷大人虛冷或有實不可吐下者馬齒礬一斤燒半日以棗膏和大人服如梧子二丸日三小兒以意減之以腹內溫爲度。

小兒五色丹猪槽下爛泥傅之乾則易之以愈爲度。

又方服黃龍湯二合幷傅瘡上。

小兒赤丹芸臺葉汁服三合滓傅上。

小兒赤丹斑駁唾和胡粉從外向內傅之良。

又方煅鐵屎爲末以猪脂和傅之。

又方屋塵以臘月猪脂和傅之。

小兒火丹赤如朱走皮中酢和豉研傅之卽愈。

又方。搗荏子傅之。

又方。猪屎。水和。絞取汁。服少許。

小兒天火丹。赤如丹。大如手。徧身或痛或癢。生麻油塗之。

小兒火丹。其瘡見骨者。搗小蒜。厚封之。着足踝者是。

小兒殃火丹。每着兩脇及腋下者。伏龍肝末。和油傅之。乾則易之。若入腹及陰。則以愼火草取汁。服之

小兒夜啼不已。醫所不治者。取狼糞中骨。燒作灰末。水服。如黍米大二枚。其啼卽已。

又方。取馬骨燒灰。傅乳上。飲兒卽止。

小兒吐痢。燒特猪屎。水解。取汁少少服之。良。

小兒大小便不通。灸口兩吻各一壯。

又方。搗白花胡葵子末。煮汁服之。

又方。雞屎白。服一錢匕。

又方。灸臍下一寸三壯。又灸橫紋百壯。又灸口兩吻各一壯。

小兒溫瘧。鹿角末。先發時便服一錢匕。

又方。灸兩乳下一指。三壯。

小兒洞注下痢。蒺藜子二升。搗汁。温服。以差爲度。

又方。木瓜搗汁飲之。

又方。炒倉米末。飲服之。

又方。酸石榴燒灰。服半錢匕。日三。

又方。炒豉令焦。水淋汁服之。神驗。冷則酒淋服。

小兒赤白帶下。薤白一把。豉一升。以水三升。煮取一升。分三服。

又方。柏葉一升。麻子末一升。以水五升。煮取三沸。百日兒每服三合。

又方。搗石榴汁服之。

又方。亂髮灰、鹿角灰等分。三歲兒以水和服三錢匕二。

中毒第三

凡卒死無脈。無佗形候。牽牛臨鼻上二百息。牛舐必差。牛不肯舐。鹽汁塗面上。卽牛肯舐。

又方。牛馬屎。絞取汁。飲之。無新者。水和乾者亦得。一法。以人溺解之。

又方。炙熨斗熨兩脇下。又治尸厥。

魘死。慎燈火。勿令手動。牽牛臨其鼻上。卽覺。

又方。搗韭汁灌鼻孔中。劇者灌兩耳。一云灌口中。

鬼魘不悟。末伏龍肝。吹鼻中。

又方。末皁角少大豆許。吹鼻中。嚏則氣通。起死人。亦治中惡。

又方。灸兩足大指叢毛中。二七壯。亦救卒死中惡。

中惡。葵心黃刺鼻孔中。血出。愈。一云。入七八寸。無苦。使目中血出。差。一云。男左女右。

又方。使人尿其面上。愈。

中惡。幷蠱毒。冷水調伏龍肝。如雞子大。服之。必吐。

又方。溫二升猪肪。頓服之。

又方。車軏脂。如雞子大。酒服之。

又法。中惡。灸胃管五十壯。愈。

卒忤中惡也。鹽八合。以水三升。煑取一升半。分二服。得吐卽愈。若小便不通。筆頭七枚。燒作灰末。水調服。卽通。

又方。犢子屎半盞。酒三升。煑服之。亦治霍亂。一云。治鬼擊。又云。大牛尿亦可用。

又方。書墨末之。水服一錢匕。

又法。卒忤死。灸手十指爪下各三壯、又灸人中三壯。又灸肩井百壯。又灸間七壯。又灸巨闕百壯。

卒中鬼擊。及刃兵傷。血漏。腹中煩滿欲絕。雄黃粉酒服一刀圭。一日三服。血化爲水。

鬼擊之狀。卒着人。如刀刺。胸腹絞痛。或吐血。或口鼻血出。或下血。雞屎白如棗大。青花麻一把。以酒七升。煮取三升。熱服。須臾發汗。不汗。熨斗盛火。灸兩肋下。熱汗出愈。

又方。艾如雞子大。三枚。以水五升。煮取二升。頓服。

又方。吹酢少許鼻中。

救自縊死。極須按定其心。勿截繩。徐徐抱解之。心下尙溫者。以氈毹覆口鼻。兩人吹其兩耳。立活。

又方。僵臥。以物塞兩耳。竹筒內口中。使兩人痛吹之。塞口傍。勿令氣出半日。死人卽噫。噫卽勿吹也。

又方。搗皁角細辛屑如胡豆大。吹之兩鼻中。

又方。搗藍靑汁灌之。

又方。刺雞冠血出。滴之口中。卽活。男雌女雄。

又方。雞血塗。

又方。雞屎白如棗大。酒半盞。灌口及鼻中。佳。

又方。菝葉。吹皁角末兩鼻中。逆出。更吹。乃可。

又方。梁上塵如大豆。各內一小竹筒子中。四人各捉一筒。同時吹兩耳兩鼻中。卽活。

又方。屎鼻口眼耳中。幷捉頭髮如筆管大一撮。掣之立活。

又方。自縊死。灸四肢大節陷大指本文名曰地神。各七壯。

熱喝著熱死者。取道上熱塵。以壅心上。若少冷。卽易。氣通卽止。

又方。仰臥喝人。熱土壅臍上。令人尿之。臍中溫。卽愈。

又方。可飲熱湯。亦可內少乾薑橘皮甘草煮飲之。稍稍咽。勿使飽。但以熱土。及熬灰土。壅臍上。佳。

又方。濃煮蓼取汁三升。飲之卽愈。如不愈。再飲。

又方。地黃汁一盞。卽愈。

又方。水半盞。和麪一大抄。服之。

又方。張死人口。令通。以暖湯徐徐灌口中。小舉死人頭。令湯入腹。須臾卽蘇。

又方。灌地漿一盞卽愈。

又方。使人噓其心。令暖。易人爲之。

又方。抱狗子或雞。著心上。熨之。

又方。屋上南畔瓦。熱熨心。冷易之。

救落水死者。以竈中灰布地。令厚五寸。以甑側著灰上。令死人伏于甑上。使頭少垂。下抄鹽二方寸匕。內竹管中。吹下孔中。卽當吐水。水下因去甑。下死人着灰中。壅身使出鼻口。卽活。

又方。掘地作坑。熬數斛灰。內坑中。下死人覆灰。溼徹卽易之。勿令大熱。煩人。灰冷更易。半日卽活。

又方。取大甑傾之。死人伏其上。令死人口臨甑口。然葦火二七把。燒甑中。當死人心下。令煙出。小入死人鼻口中。鼻口中水出盡。則活。火盡則復益之。常以手候死人身。及甑。勿令甚熱。當令火氣能使死人心下足得暖。卒無甑者。于岸側削地如甑。空下如竈。燒令暖。以死人着上。亦可用車轂爲之。勿令隱其腹。令死人低頭。水得出。幷炒灰數斛。令暖。以粉。身溼更易溫者。

又方。但埋死人暖灰中。頭足俱沒。惟開七孔。

又方。倒懸死人。以好酒灌鼻中。又灌下部。又醋灌鼻亦得。

又方。緜裹皁角。內下部中。須臾水出。

又方。裹石灰內下部中。水出盡。則活。

又方。熬沙覆死人面。上下有沙。但出鼻口耳。沙冷溼卽易。

又方。倒懸。解去衣。去臍中垢。極吹兩耳起迺止。

又方。竈中灰二石。埋死人。從頭至足出七孔卽活。

又方。屈兩脚着生人兩肩上。死人背向生人背。卽負持走行。吐出水。便活。

又方。落水死。解死人衣。灸臍中。凡落水經一宿。猶可活。

冬日落水凍。四肢直。口噤。有微氣者。以大器中熬灰使暖。盛以囊。薄其心上。冷卽易。心暖氣通。目得轉。口迺開。可温尿粥。稍稍呑之。卽活。若不先温其心。便持火灸身。冷氣與火爭。卽死。

卒中惡風。心悶煩毒欲死者。急灸足大指下横文。隨年壯。卽愈。

上件病。若筋急不能行者。內踝筋急。灸內踝上四十壯。外踝筋急。灸外踝上三十壯。立愈。

卒中惡風。眼戴睛。灸目兩背後二七壯。

上件病。若不識人者。灸季肋頭七壯。

卒中惡心痛。苦參三兩。㕮咀。以好酢一升。取八合。強人。頓服。老小二服。

又方。桂心八兩。㕮咀。以水四升。煑取一升半。分作二服。

飲食中毒第四

凡諸食中毒。飲黃龍湯。及犀角汁。無不治也。飲馬尿。亦良。

又方。食百物中毒。掘地坑中著水。取以飲之。

又方。含貝子一枚。須臾吐食物差。

又服生韭汁數升。亦得。

中毒煩悶。苦參三兩。㕮咀。以酒二升半。煮一升。頓服之。取吐。愈。

食六畜肉。中毒。各取六畜乾屎末。水服之。佳。

食自死六畜肉毒。服黃藥末方寸匕。須臾復出。

又方。燒小豆一升末。服三方寸匕。

又方。水服竈底黃土方寸匕。

食生肉中毒。掘地深三尺。取下土三升。以水五升。煮土五六沸。取上清。飲一升。立愈。

食牛肉中毒。狼牙灰。水服方寸匕。一作猪牙。

又方。温湯服猪脂。良。

又方。水煮甘草汁。飲之。

食馬肉。血洞下。欲死。豉二百枚。杏仁二十枚。㕮咀。蒸之。五升米下飯。熟。搗之。再服。令盡。

又方。蘆根汁飲。以浴。卽解。

食猪肉中毒。燒猪屎末。服方寸匕。犬屎亦佳。

食百獸肝。中毒。頓服猪脂一斤。佳。

食陳肉毒方同上。

食馬肝中毒牝鼠屎二七枚兩頭尖者是以水研飲之不差更作。

食野菜馬肝肉諸脯肉毒取頭垢如棗核大呑之可起死人。

又方燒狗屎灰水和絞取汁飲之立愈。

又方燒猪骨末之水服方寸匕日三。

茅屋漏水沾脯上有毒搗韭汁服之良大豆亦得。

肉閉在密器中者名鬱肉有毒燒狗屎末水服方寸匕凡生肉熟肉皆不藏蓋不泄氣皆殺人又肉汁在器中密蓋氣不出亦殺人。

脯在黍米中有毒麴一兩水一升鹽兩撮煑服之。

食中射罔脯毒末貝子水服如豆佳不差又服。

食餅臘中毒方同上。

以肉作餅臘食多吐下服犀角末方寸匕甚良。

食鵝鴨肉成病胸滿面赤不下食者服秫米泔大良。

食中魚毒煑橘皮湯停極冷飲之其效甚大。

食中魚毒。及中鱸魚毒。剉蘆根。舂取汁。多飲。良。亦可取蘆葦茸汁飲之。

蟹毒。方同上。又冬瓜汁服二升。亦可食冬瓜。

山中木菌毒。人屎汁。服一升。良。

食魚膾不消。燒魚鱗。水服方寸匕。

食諸鮑魚中毒。方同上。

食牛馬肉中毒。飲人乳汁。良。

酒病。豉。荻白各一升。以水四升。煮取二升。頓服之。

飲酒中毒。煮大豆三沸。飲汁三升。

又方。酒漬乾柹汁。服之。

酒醉不醒。葛根汁一斗三升。飲之。取醒止。又治大醉連日。煩毒不堪。

千金寶要卷之二

解百藥毒第五

凡解百藥毒甘草薺苨大小豆汁藍汁藍實汁藍根汁並解。

雄黃毒防己解。

礬石毒大豆汁解。

金銀毒服水銀數兩卽出鴨屎解水和雞屎汁煮葌汁並解。

鐵粉毒磁石解。

防葵毒葵根汁解。

桔梗毒白粥解。

甘遂毒大豆汁解。

芫花毒防己、防風、甘草、桂汁、並解。

大戟毒菖蒲汁解。

蜀椒毒葵子汁桂汁豉汁人尿冷水土漿蒜雞毛燒吸煙及水調服解。

斑貓芫青毒。猪脂大豆汁。或鹽藍汁。鹽湯煮猪骨。並解。

馬刀毒。清水解。

杏仁毒。藍子汁解。

野芋毒。土漿人糞汁解。

諸菌毒。掘地作坑。以水沃中。攪之令濁。澄清。飲之。名地漿。解。

解鴆毒及一切毒藥不止者。甘草蜜四兩。粱米粉一升。以水五升。煮甘草。取二升。去滓。歇大熱。內粉湯中。攪令勻調。內白蜜更煮。令熟如薄粥。適寒温。飲一升。最佳。

解一切毒。母猪屎。水和。服之。又水三升三合。和米粉飲之。

野葛毒。已死口禁者。取青竹去兩節。柱兩肋臍上。內冷水注之。暖卽易之。須臾口開。開卽服藥。立活。惟須數易水。

石藥毒。白鴨屎。人參汁。並解。

食莨菪。悶亂。如卒中風者。飲甘草汁。藍青汁。卽愈。

中鈎吻毒。欲死者。薺苨八兩。㕮咀。以水六升。煮取三升。冷。如人體。服五合。日三夜二。凡煮薺苨。惟濃佳。

又方。煮桂汁。飲之。

又方。嗽菝涕。

諸毒。方同上。

中蠱。茜根蘘荷根各三兩。㕮咀。以水四升。煑取二升。頓服。

又方。槲樹北陰白皮一大握。長五寸。水三升。煑取一升。空腹服。卽吐。蠱出。

中蠱下血。方同上。

諸熱毒。或蠱毒。口鼻血出。取人屎尖七枚。燒作火色。置水中。研之。頓服。卽愈。亦解百毒。時氣熱病之毒。服已。溫覆。取汗。勿輕。此方極神驗。

諸服藥過劑悶亂者。飲藍汁。水和胡粉。地漿。蘘荷汁。水和葛粉。粳米瀋。乾羌。黃連。飴糖。豉汁。並解。

瘡中水毒。炭白灰胡粉等。脂調。塗瘡孔上。水出則痛止。

瘡中水腫。方同上。

卒刺手足。中水毒。搗韭及藍青。置上。以火灸。熱徹卽愈。

破傷風腫。厚塗杏仁膏。然麻燭。遙灸之。

蛇蝎毒等第六

凡蛇毒。消蠟注瘡上。不差。更消注之。又以母猪耳中垢傅之。牛耳垢亦可。

蝮蛇毒。令婦人尿瘡上。
又方。令婦人騎度三過。又令坐上。
又方。末羌傅之。乾則易。
又方以射罔塗腫上。血出卽愈。
又方。生麻楮葉合搗。以水絞去滓。漬之。
衆蛇毒。乾羌雄黃等分。末和射罔。着竹洞中。有急用之。
又方。雄黃末傅瘡上。日一。
又方。用銅青傅瘡上。
又方。搗大蒜和胡粉傅之。
又方。雞屎二七枚。燒作灰。投酒服之。
又方。以麪團上。令童男尿其中。燒鐵令赤。投中。冷復燒着。二三度差。
又方。口嚼大豆葉。塗之。
又方。猪脂和鹿角灰。塗之。
又方。鹽四兩。水一斗。煑十沸。定。以湯浸。冷易之。

又方。搗紫莧取汁。飲一升。以滓封瘡。以少水灌之。

又方。梳中垢如指大長一寸。尿和傅之。

又方。炙梳汗出。熨之。

又方。取合口椒胡荽苗等分。搗傅之。無不差。

又方。灸螫處三七壯。無艾。以火頭稱瘡孔大小。熱之。

蛇嚙。人屎厚塗。帛裹卽消。

睡中蛇入口挽不出。以刀破蛇尾。內生椒三兩枚。裹着。須臾卽出。

又方。艾灸蛇尾卽出。

又方。以刀周匝。割蛇尾。截令皮斷。仍將皮倒脫。卽出。

蛇入口並七孔者。割母猪尾頭。瀝血着口。卽出。

又方。以患人手中指等。截三歲大猪尾。以器盛血。傍蛇。瀉血口中。拔出之。

卒爲蛇繞不解。以熱湯淋之。

又方。令人尿之。

蛇蝎螫。服小蒜汁。滓傅上。

又方。熟搗葵取汁服。

又方。取齒中殘飯傅之。

又方。猪脂封之。

又方。射罔封之。

又方。硇砂和水塗上立愈。

又方。若着手足冷水浸。水微暖則易之。着餘處冷水浸。故布揄之。小暖則易。

又方。生烏頭末唾和傅之。

射工毒不治。七日能殺人。鬼臼葉一把。內苦酒中漬之。熟搗絞汁服一升。日三爲妙。

又方。取生吳茱萸莖葉一握。斷去前後。握中熟搗。以水二升。煑取七合。頓服之。立愈。

又方。取葫切貼瘡。灸七壯。

又方。赤莧菜搗絞取汁。一服一升。日四五服。

又方。白雞屎取白頭者三枚。湯和塗中毒處。

已有瘡者。取芥子熟搗。苦酒和。厚塗瘡上。半日。痛便止。

又方。取狼牙葉冬取根。搗之。令熟□□中處。又飲汁四五合。

蚰蜒入耳。炒胡麻搗之。以葛袋盛。傾耳枕之。卽出。

又方。以牛酪灌之。滿耳卽出。出□□消。若入腹中。空腹。食好酪一二升。卽化爲黃水而出。不盡。更服。于眞人自云。手用神効。

水毒。凡山水有毒蟲。人涉水。中人似射工而無物。其診法。初得之。惡寒。微似頭痛。目眶疼。心中煩懊。四肢煩。腰背百節皆強。兩膝痛。或翕翕而熱。但欲睡。旦醒暮劇。手足逆冷。至肘膝。一三日腹中生蛊。食人下部。肛中有瘡。不痛不癢。令人不覺。不急治。過六七日。下部出濃潰。蛊上食人五臟。熱盛毒煩。下利不禁。八九日良醫不能治矣。不過二十日殺人。欲知是中水與非者。當作五六升湯。以小蒜五升。㕮咀。投湯中。消息。勿令大熱。去滓以浴之。是水毒。身體當發赤斑。無異者非也。治中水毒。取梅若桃葉。搗絞。取汁三升許。或乾。以少水絞取汁飲之。小兒不能飲。以汁傅乳頭與喫。

又方。搗瘡耳汁。服一升。又以緜裹杖。沾汁。導下部。日二過卽差。

又方。蓼一把。搗。以酒和。絞取汁一升。服之。不過三服。一作藜葉。

又方。藍一把。搗。水解。以塗。浴面目身體。令遍。

又方。搗蛇莓根末。水飲之。幷導下部。生者用汁。凡夏月行。常多賫此藥屑。入水。以方寸匕投水上流。無所畏。又能辟射工。凡洗浴。以少許投水盆中。卽無毒。

人忽中水毒手足指冷或至肘膝者浮萍暴乾末之酒服方寸匕

八九月中刺手足犯惡露腫殺人生桑枝三枝內煻灰中推引之令極熱斫斷正以頭柱瘡口上熱盡即易之盡三枝則瘡自爛仍取薤白搗絲裹着熱灰中使極熱去絲取薤白傅瘡上以布帛急裹之若有腫者便作之用薤白第一佳

竹木刺皮中不出羊糞燥者燒爲灰和猪脂塗刺若不出再塗一云用乾羊屎末

又方服王不留行即出兼取根末貼之

又方煮山藿麥汁飲之日三差止

又方用牛膝根莖生者併搗以薄之即出瘡雖合猶出

又方嚼白梅塗之

又方白茅根燒末以膏和塗之亦治瘡因風致腫

又方燒鹿角末以水和塗之立出久者不過一夕

又方頭垢傅之即出

惡刺苦瓠開口內兒尿煮三兩沸浸病上

又方濃煮大豆汁漬取差

又方。萆薢根。水煮。浸之。冷復易。

喉痺金瘡等第七

喉痺。桂心末如棗核大。緜裹。着舌下。卽破。

又方。荊瀝稍稍咽之。

又方。只將顯上近頭心髮直上。作力提之。其喉痺。剝然一聲。遂破。最奇。

墮落車馬。及車輾木打已死者。以死人安着。以手袖掩其口鼻眼上。一食頃活。眼開。與熱小便二升。

凡墮落傷損。欲死。取淨土五升。蒸之令溜。分半。以故布數重。裹之。以熨病上。勿令大熱。恐破肉。冷則易之。

取痛止則已。凡有損傷。以此法治之。神效。已死不能言者。亦活。三十年者亦差。

腕折骨損者。以大麻根葉搗汁。飲一升。無生麻。煮乾麻汁服。

腕折四肢骨碎。及筋傷蹉跌。生地黃不限多少。熟搗。用薄所損處。又云。爛搗。熱之。以裹傷處。以竹編夾裹令遍。縛令急。勿令轉動。一日可十易。三日差。若血聚在折處。以刀子破去血。

四肢骨碎筋傷蹉跌。豉三升。水三升。漬。取汁服之。

頭破腦出中風口噤。大豆一斗。熬去腥。勿使太熟。搗末。熟蒸之。氣徧合甑下。以酒一斗淋之。溫服一升。覆取汗。傅杏仁膏於瘡上。

凡被打損血悶搶心氣絕不能言可闢開口尿其中令下咽即醒

卒中毒矢搗藍汁一升飲之并薄瘡上若無藍取青布漬絞汁飲之并淋瘡中

又方內鹽臍中灸之

又方煎地黃汁作丸服之百日矢當出

又方煮蘆根汁飲三升

又方多飲葛根汁并治一切金瘡

又方末雄黃傅之當沸汁出愈

又方末貝齒服一錢匕大良

又方搗葛根汁飲之葛白屑熬黃傅瘡止血

金瘡破腹腸突出欲令入取人屎乾之以粉腸即入矣

又被傷腸出不斷者作大麥粥取汁洗腸內之當研米粥飲之二十日稍稍作強糜百日後乃可差耳

金瘡煩滿赤小豆一升以苦酒漬之熬令燥復漬滿三日令色黑服方寸匕日三

箭鏃及諸刀刃在咽喉胸膈諸隱處不出者牡丹皮一分白鹽二分一方作白斂二味治下篩以酒服方寸匕日三出

又方。取苦蔞汁。塗箭瘡上。卽出。

又方。酒服藿麥方寸匕。日三差。

卒爲弓弩矢所中。不出。或肉中有聚血。取婦人月經布。燒作灰。屑酒服之。

又方。白斂半夏等分。治下篩酒服方寸匕。日三。淺瘡十日出。深瘡二十日出。

金瘡血出不止。桑根十沸。服一升。卽止。

又方。柳絮封之。

又方。搗車前汁傅之。血卽絕。連根用。立效。

又方。飲人尿三升。愈。

又方。以蜘蛛幕。貼之。

金瘡腹中瘀血。大麻子三升。大菱白二七枚。使數人各搗。令熟。用九升水。煑取一升半。頓服之。若血出不盡。腹中有濃血。更合服。當吐膿血耳。

金瘡內漏。還自取瘡中血。着杯中。水和服。

又方。七月七日麻勃一兩。蒲黃六兩。酒服一錢匕。日五夜二。

又方。牡丹皮爲散。水服。三指撮。立尿出血。

金瘡若痛。楊木白皮。熬令燥。末之。服方寸匕。日三。又末傅瘡。愈。

金瘡若刺瘡痛不可忍。百治不差者。菝一把。以水三升。煮數沸。漬洗瘡。止痛。良

傷墜車馬。及諸物隱體肉斷者。以酢和麪塗之。

筋骨傷。初破時。以熱馬尿傅之。無瘢。

又方。大豆二升。水五升。煮取二升。以醇酒六七升合。和豆升。服之。一日盡。如湯沃雪。用小豆。亦佳。

落車墜馬。及木崩血。腹滿短氣。大豆五升。以水一斗。煮取二升。去豆。一服令盡。劇者不過三作。

金瘡。便以石灰厚傅。無石灰。只灰亦可。裹之。止痛。又速愈。若深。未宜速合者。內少滑石。令瘡不時合也。

針灸瘡。血出不止。燒人屎灰。傅之。

金瘡。出血多。其人必渴。當忍之。噉燥食。并肥脂之物。以止渴。慎勿醎食。若多飲粥及漿。犯即血動。溢出。殺人。又忌嗔怒。大言笑。思想陰陽行動。作勞。多食酸醎。飲酒。熱羹臛。輩瘡差後。猶須如此。出百日半年。乃可復常也。

又方。燒乾梅作炭。擣末傅之。一宿即差。亦治被打傷。

又方。磁石末傅之。止痛斷血。

又方。桑白汁塗。桑白皮裹。或石灰封之。妙。

又方。麻葉三升。以水三升。煮取三升半。爲一服。

又方。飲麻子汁數升。亦治毒箭所傷。

又方。蚯蚓屎。以水服方寸匕。日三。

又方。杏仁石灰細末。猪脂和。封。亦主犬馬金瘡。

又方。搗穀子傅之。

瘡疽癰腫第八

發背。亂髮灰。酒服方寸匕。亦治瘰疬。

又方。飲鐵漿二升。取利。

又方。三年醋滓。微火煎令稠。和牛脂傅上。日一易。

又方。猪脂傅上。日四五。亦治發乳。

又方。猪羊脂。切作片。冷水浸。貼上。暖則易之。五六十片差。初貼少許。卽寒。寒定。好眠。甚妙。

又方。燒鹿角灰。醋和。傅之。日四五。

瘰疬。手足肩背。累累如赤豆。剝之。汁出。蕪菁子熬搗。帛裹。展轉傅上。良。

又方。以麻子熬作末。摩其上。良。

又方酒和麪傅之。

又方剝去瘡痂溫醋泔清洗之以胡燕巢百日男兒屎如膏傅之。

又方亂髮灰服方寸匕日三亦治發背。

又方煮芸薹菜取汁一升服之并食乾熟芸薹數頓少與鹽醬冬月用其子水和服之。

又方以猪膽傅之良。

又方枸杞根葵根葉煮汁煎如糖服之隨意。

又方臈月糖壹夜浸之數日乃愈。

疽潰後鹽湯洗拭了燒皁角灰粉之良。

又方以牛耳中垢傅之良。

又方以生麻油滓緜裹帖瘡上重出。

又方以沸湯灌瘡中三四徧。

疽似癰而小有異今日去膿了明日還滿膿如小豆汁者芸薹熟搗濕布袋盛之埋熱灰中更互熨之即快得安不過再三即差冬用乾者。

又方皁角煎湯洗拭乾以蘖皮末傅勿令作痂。

一切腫毒痛不可忍者。取萆麻子。搗傅之。卽差。

惡毒腫。一宿可殺人者。茴香草搗取汁。飲一升。日三四服。滓傅腫上。冬中根亦可用。起死神方。

魚臍丁瘡。不大痛者。殺人。以寒食餳傅之。良。又硬者燒灰塗貼。卽差。

又方。先以針刺瘡上四畔。作孔。搗白苣。取汁。滴瘡孔內。

丁腫忌見麻勃。見卽死者。以針刺四邊。及中心。塗雄黃末。立愈。一云塗黃土。

又方。鼠新坌土。和小兒尿傅之。

又方。鐵衣末。和人乳汁傅之。立可。

又方。小豆花爲末。傅之。差。

又方。人屎尖傅之。立差。

又方。以四神丹一枚。當頭上安。經宿。則根出矣。四神丹方。在第十二卷中。

凡腫病須百方內外攻之。生商陸一斤。猪脂一斤。煎可得二升。二味如煎。令黃。去滓。以磨腫處。亦可服少許。幷塗以緡漬之。燥輒傅之。不過三日。差。

因瘡腫痛者。皆中水及中風寒所作。其腫入腹。則殺人。溫桑灰汁漬之。冷復溫之。常令熱。神祕。

治癰。芫花爲末。膠和如粥。傅之。

瘡發心胸以下者。武都雄黃松脂各三兩。和爲塊。刀子刮爲散。飲服方寸匕。日三。不差。更合。石癰。堅如石不作膿者。生商陸根。搗傅之。乾則易之。取軟爲度。又治濕漏諸癰節。

又方。蜀桑根白皮。陰乾。搗末。炷膠。以酒和藥。傅腫。卽拔出根。

又方。醋和萇菁子末。傅頭上。卽拔出根。

又方。蛇脫皮貼之。經宿。差。

又方。梁上塵。葵根莖灰。等分。醋和。傅之。卽差。

又方。櫟子一枚。以醋于青石上。磨之。以塗腫上。乾更塗。不過十度。卽愈。

又方。當上灸之百壯。石子當碎出。如不出。益壯。乃佳。

癰腫痛。煩悶。生楸葉十重貼之。以帛包。令緩急得所。日二易。止痛。兼消腫。蝕膿。其良勝于衆物。如冬月。先收乾者。用時。鹽潤之亦可。薄消。楸皮用之。

始覺腫。令消。以萇菁末。三指撮。水和。服之。日三。神良。

已結膿。使聚。苦蔞根末之。苦酒和。傅上。燥則易。赤小豆亦佳。

癰腫。芥子末湯和。傅紙上。貼之。

又方。白薑石末。蒜和搗。傅上。差。

又方。馬鞭草搗傅上。卽頭出。

又方。灸兩足大拇指奇中立差。仍隨病左右。

瘛無頭者。呑葵子一枚。不得多服。

又方。燒葛蔓灰封上。自消。牛糞灰亦佳。

又方。鼠粘根葉貼之。

又方。水和雀糞傅之。

又方。生椒末。釜下土等分。醋和。塗之。一法。有麴末。

癰有膿令潰。雞羽三七枚。燒末。服之。卽潰。

又方。人乳和麪傅上。比曉。膿血出幷盡。不用近手。

又方。箔綆繩。燒灰末。臘月猪脂和。傅下畔。卽潰。不須針灸。

膿潰後。瘡不合。熟嚼大豆。傅之。

又方。炒烏麻令黑。熟搗傅之。

又方。牛糞傅之。乾則易。

又方。燒破蒲席灰。臘月猪脂和。內孔中。

癰久不差。馬齒葉搗汁。煎傅之。

癰瘡潰後膿不斷。及諸物刺傷。瘡不差者。石硫黃粉一兩。筋一片。搥頭碎。少濕。內硫黃中。以刺瘡孔。瘡差爲度。

癰肉中如眼。諸藥不效。犯丁瘡。蕪菁根。鐵生衣等分。和搗。以大針刺作孔。復削蕪菁根如針大。以前鐵生衣塗上刺孔中。又塗所搗者。封上。仍以方寸匕。緋帛塗貼之。有膿出。易之。須臾拔根。立差。忌油膩生冷。醋滑。五辛。陳臭。粘食。

又方。刺瘡頭。及四畔。令汁極出。搗生栗黃。傅上。以麪圍之。勿令黃出。從旦至午。根卽拔矣。

又方。以麪圍瘡。如前法。以針亂刺瘡。銅器煮醋令沸。瀉麪圍中。令容一盞。冷則易之。三度。卽拔根出。

又方。取蛇脫皮如雞子大。以水四升。煮三四沸。去滓。頓服。立差。

又方。取蒼耳苗。搗取汁一二升。飲之。滓傅上。立差。

一方。灸掌後橫文後五指。男左女右。七壯。

癰肉中如眼。諸藥不效。取附子削令如碁子。安腫上。以唾貼。以火灸之。令附子欲焦。復唾濕。復以火灸之。如是三度。令附子熱氣徹內。卽差。

一切毒腫疼痛。取萆麻子熟搗傅之。卽差。

脚腫向上。至腹卽殺人者。赤小豆一斗。以水三斗。煮令爛。出豆。以汁浸脚。至膝。每日一度。差止。若已入腹不須浸。但煮豆食之。忌鹽菜米麪等。渴飲汁。差乃止。

瘡久不差。差而復發。骨從孔出。名骨疽。以猪脂和楸葉搗。封之。

又方。搗白楊葉傅之。

又方。蕪菁子搗傅之。帛裹。一日一易。

又方。穿地作坑。口小裏大。深三尺。取乾雞屎二升。以艾及荆葉搗碎。和雞屎。令可然火。坑中燒之。令煙出。將疽就坑口熏之。以衣擁口。勿泄氣。半日。當有蟲出。甚效。

附骨疽。槲皮燒灰。飲服方寸匕。

又方。灸間使後一寸。隨年壯。立差。

一切丁腫。蒼耳根莖苗子。但取一色。燒爲灰。酢泔淀和。如泥。塗上。乾則易之。不過十度。卽拔根出。神良。

又方。取鐵漿。每飲一升。立差。

又方。麪和臘月猪脂。封上。立差。

又方。蒺藜子一升。燒灰。醶醋和。封上。經宿便差。或針破頭。封上。更佳。

又方。皁角子取仁。作末。傅之。五日內差。

又方。艾蒿一擔燒作灰。于竹筒中淋取汁。以一二合和石灰。如麪漿。以針刺瘡中。至痛。卽點之。點三遍。其根自拔。

赤眼丁。熬白粉令黑。蜜和。傅之。良。

又方。以新坌鼠壤。水和塗之。熱則易之。

又方。搗馬牙齒末。臘月猪脂和。傅之。可拔根出。亦燒灰用。

火燒瘡。愼不得以冷水洗。熱得冷。更深入骨。壞人筋骨。□□初被火燒。急更向火灸。雖大痛。強忍之。一食久。卽不痛。神驗。

又方。家中一女子。火燒手。且浸浸至掌。急以酸酢升餘浸之。出酢。尙痛時不痛止。不瘡。不膿。不瘢。神妙神妙。

又方。未熬油麻。和梔子仁。塗之。惟厚爲佳。

又方。已成瘡者。燒白糖灰粉之。卽燥。立差。

因瘡而腫痛劇者。數日死。或中風寒。或中水。或中狐尿。刺燒黍穰。若牛馬屎。若生桑條。燒取多煙。以熏之。汗出愈。如無生桑條。取得多煙之物燒。熏。汗出愈。

又方。熱蠟內瘡中。新瘡亦善。

又方。以鳧公英草。根莖白汁塗之。惟多塗爲佳。大神効。此草蜀中名耳瓣菜。關中名苟乳。乳奴狗切。

腸癰。雄雞頂上毛。幷屎。燒作末。空心酒服。

又方。截取檐頭尖少許。燒作灰。水和服。當作孔出膿血。愈。

又方。瓜子三升末之。以水三升煮。取一升五合。分三服。

又方。死人冢上土作泥。塗之。

內癰未作頭者。服雞屎卽差。

又方。腸癰。屈兩肘正。灸肘頭銳骨各百壯。則下膿血。卽差。

婦人妬乳。取葵莖灰末之。飲服方寸匕。日三□□□法爲末。不爲灰。

又一方。取研米槌二枚。灸令熱。以絮及故帛搨乳上。以槌更互熨之。差止。

乳癰。以水礶盛酢泔清。燒石令熱。內中。沸止更燒。如前。少熱。內乳漬之。冷更燒石。內漬。不過三燒石卽愈。

又一方。取蒻白搗傅之。幷紋汁一升。頓服。卽愈。

又方。柳根削取上皮。搗令熟。熬令溫。盛練袋中。熨乳上。乾則易之。一宿卽愈。

又方。鹿角治下篩。以猪脂上清汁。服方寸匕。不過再服。亦可以醋漿水服。

千金寶要卷之三

霍亂吐瀉第九

霍亂轉筋。蓼一把。去兩頭。以水二升。煑取一升。頓服之。一方作梨葉。

又方。燒故木梳灰末之。酒服一枚。小者永差。

又方。車轂中脂。塗足下。差。

又方。作極鹹鹽湯。千槽中煖漬之。

又方。以醋煑青布搨之。冷復易之。

轉筋不止。若男子。以手挽其陰牽之。女子。挽其乳近左右邊。

轉筋在兩臂及胸中者。灸手掌白肉際七。又灸亶中。中府。巨闕。胃管。尺澤。并治筋拘踵足。皆愈。

霍亂引飲。飲輒乾嘔。生薑五兩。㕮咀。以水五升。煑取二升半。分二服。高良薑大佳。

中熱霍亂。暴利。心煩。脉數。欲得冷水者。新汲井水。頓服一升。立愈。先患胃口冷者。勿服之。

霍亂吐下腹痛。以桃葉煎汁。服一升。立止。冬用皮。

走哺轉筋。灸踵踝。白肉際。各三七壯。又灸小腹下橫骨中央。隨年壯。

轉筋四厥。灸兩乳根黑白際各一壯。

轉筋。灸湧泉六七壯。在足心下當拇趾大筋上。又灸足大趾下。約中一壯。

又方。轉足踝聚筋上白肉際七壯立愈。

轉筋入腹。痛欲死。四人持手足。灸臍上一寸。十四壯。自不動。勿復持之。又灸股裏大筋。去陰一寸。

霍亂轉筋。令病人合面正臥。伸兩手著身。以繩橫量兩肘尖頭。依繩下夾脊骨兩邊。相去各一寸半。灸一百壯。無不差。

霍亂已死有煖氣者。灸承筋。取繩量圍足。從趾至跟匝。捻取等折一半。以度令頭至跟踏地處。別綖上至度頭。卽是穴。灸七壯。起死人。又以鹽內臍中。灸二七壯。

霍亂洞下不止。艾一把。水三升。煮取一升。頓服之良。

又方。香茅一把。水四升。煮取一升。頓服之。青木香亦佳。

蠱毒宿食不消。霍亂。極鹹鹽湯三升。熱飲一升。刺口令吐。宿食使盡。不吐。更服。吐訖。復飲。三吐乃住。此法大勝諸治。俗人以爲田舍淺近法。鄙而不用。守死而已。凡有此病。卽須先用之。

又方。藿豆一升。香薷一升。以水六升。煮取二升。分服。單用亦得。

胞轉小便不通。亂髮急纏如兩拳大。燒末。醋四合。和二方寸匕。服之。訖。卽炒熟黑豆葉。蹲坐其上。

又方。阿膠三兩。水二升。煑取七合。頓服之。

又方。豉五合。以水三升。煑數沸。頓服之。

又方。麻子煑取汁。頓服之。

又方。連枷關燒灰。水服之。

又方。筆頭燒灰。水服之。

又方。灸玉泉七壯。穴在關元下一寸。大人從心下處取八寸。是玉泉穴。小兒斟酌取之。

又法。灸第十五椎五十壯。

又法。灸臍下一寸。隨年壯。一曰四寸。

吐逆霍亂吐血。灸手心主五十壯。

吐血。生地黃肥者五升。搗以酒一升。煑沸。三上三下。去滓。頓服之。

又方。服桂心末方寸匕。日夜可二十服。亦治下血。

忽吐血。熟艾三雞子許。水五升。煑取二升。頓服。

又方。燒亂髮灰。水服方寸匕。日三。亦治舌上忽出血如簪孔者。亦治小便出血。

中蠱下血日數十行。苦瓠一枚。以水二升。煑取一升。稍稍服之。當下蠱。及吐蝦蟆科斗之狀。一月後乃盡。

又云苦瓠毒。當臨時量用之。又云。用苦酒一升煑。

虎犬馬傷第十　針折入肉附

虎咬瘡。煑葛根令濃。以洗之十遍。飲汁。及搗爲散。以葛根汁服方寸匕。日五。甚者夜二。

又方。青布急卷爲繩。止一物。燒一頭。然內竹筒中。注瘡口薰之。妙。

又方。煑鐵令濃。洗瘡。

又方。嚼栗子塗之。良。

剝死馬骨傷人。毒攻欲死。便取馬腸中屎。塗之。大良。

又方。取其屎燒灰。服方寸匕。

狂犬咬人毒。有七日一發。百日內殺人者。每到七日。搗韭汁飲一二升。當終身禁食犬肉蠶蛹。若犯則死不可救。瘡未愈之間。禁食生魚。及諸肥膩冷食。但于飯下蒸魚。及于肥器中食。便發。不宜飲酒。過一年乃佳。

獨犬嚙人。搗地榆。絞汁塗瘡。無生者。取乾者以水煑汁飲之。亦可。末之。服方寸匕。日三。兼傅之。過百日止。

又方。搗韭絞汁飲一升。日三。瘡愈止。

又方。以豆醬清塗之。日三四。

又方刮虎牙或骨服方寸匕。

獗犬毒燒虎骨傅瘡及熨又微熱杏仁搗研取汁服之良又取燈盞殘油灌瘡口此皆禁生菜猪肉魚酒。

又方用韭根故梳二枚以水二升煮取一升頓服。

又方桃東南枝白皮一握水二升煮取一升分二服吐出犬子。

又方服莨菪子七枚日一。

又方梅子末酒服。

獗犬所齧惡血未盡灸上一百壯以後當日灸一壯若不血出刺出其血百日灸乃止禁飲酒猪犬肉。

凡犬嚙人以熱牛屎塗之佳。

針折入肉中刮象牙末水和聚着折針上卽出。

又方磁石吸鐵者着上卽出。

舌耳心目等大小便第十一

舌卒腫滿口溢出須臾不治殺人急以指刮破舌兩邊去汁卽愈。

又方取釜下墨以酢厚傅舌上下脫去更傅佳。

又方半夏十二枚洗熟以酢一升煮取八合稍稍含漱之吐出加生薑一兩佳。

又方。滿口含糖酢少許時。熱通卽止。

舌上出血如泉。燒鐵篦。熟烙孔中。良。

舌強不語。礬石桂心等分爲末。安舌下。立差。

耳中有物不可出。以弓弦從一頭令散。傅好膠。注耳中物上。停之。令相着。徐徐引之。

耳聾乾耵聹不可出。三年酢灌之。最良。緜塞之半日許。必有物出。

百虫入耳。末蜀椒一撮。以酢半升。調。灌耳中。行二十步。卽出。

又方。桃葉火熨卷之。口塞耳。立出。

又方。車肛脂傅耳孔。自出。肘後。以療聹耳膿血。

又方。以菝涕灌耳中。虫卽出。亦治耳聾。

齒斷間血出不止。生竹茹二兩。醋煮含之。

又方。溫童子小便半升。取三合含之。其血卽止。

九孔出血。搗荊葉取汁。酒服二合。一卽荊芥。

九種心痛。取當太歲上新生槐枝一握。去兩頭。㕮咀。以水三升煮。取一升。頓服。

又方。桃白皮煮汁。空腹。以意服之。

婦人心痛。布裹鹽如彈丸。燒作灰。酒服。

又方。燒秤錘。投酒中服。佳。

又方。炒大豆。投酒中服。佳。

產後卒心腹痛。桂心三兩。酒三升。煮取二升。去滓。分三服。日三。

又腹中苦痛。生牛膝五兩。酒五升。煮取二升。去滓。分二服。若乾牛膝根。卽酒浸一宿。方可煮。

奔豚氣急。作湯以浸兩手足。數數易之。

又方。灸章門百壯。一名長平。一穴在大橫外。直臍肋端。

又方。灸氣海百壯。穴在臍下一寸半。

又方。灸關元百壯。在臍下三寸。

又方。灸中極五十壯。在臍下四寸。

又方。灸期門百壯。直乳下第二肋端。傍一寸五分。

又方。灸四滿二七壯。穴夾丹田兩傍。相去三寸。卽心下八寸。臍下橫文是也。

奔豚腹中與腰痛。灸中府百壯。穴在兩乳上三肋間。

耳聾有膿不差。有虫。先以緜纏去耳中汁。以礬石末粉耳中。次以石鹽末粉其上。食久乃起。不過再。永差。

聤耳。桃仁熟搗。以故緋絹裹。內耳中。日三易。以差爲度。

治底耳。黃礬燒。緜裹。內耳中。不過三日。愈。或以葦管吹耳中。

治虫心痛。鶴蝨末之。密和梧子大。服四十丸。日三。蜜湯下。加至五十丸。愼酒肉。

又方。鶴蝨一兩末之。空腹。溫酢一盞。和服之。虫當吐出。

又方。服漆一合。

熱翳漫睛。以羊筋漱口。熟嚼。夜臥。開目納之。卽閉目睡。去膜。明日差。亦治眯目。

眼暗。以銅器盛大酢三四升。煎七八日。覆器溼地。取銅青一合。以三月杏白仁一升。取汁。和銅青傅之。日不過三四度。大良。

又方。含黃蘗一爪甲許。使津。置掌中。拭目訖。以水洗之。至百日眼明。此法乃可終身行之。永除眼疾。神良。

雀目術。令雀目人至黃昏時。看雀宿處。打令驚起。雀飛。乃呪曰。紫公紫公。我還汝盲。汝還我明。如此日日暝。三過作之。眼卽明。曾試有驗。

大小便不通。葵子末一升。青竹葉。以水二升。煮五沸。頓服。

又方。葵子一升。榆皮一升。水五升。煮。取二升。分三服。

又方。葵子一升。以水三升。煮。取一升。去滓。納猪脂一升。空腹。分二服。

又方。甑帶煮取汁。和蒲黃方寸匕。日三服。

又方。猪脂一升。以水二升煮。三沸。飲汁。立通。

又方。灸臍下一寸三壯。

失欠頰車蹉。一人以手指牽其頤。以漸推之。則復入矣。推常疾出指。恐悞齒傷人指也。

又方。消蠟和水傅之。

目眯不出。以蠶沙一粒吞之。卽出。

卒食物入鼻。有入腦。羊脂如指大。內鼻中。吸上。物隨脂下。

鼻中出血不止。搗楮葉汁。飲三升。大良。

齒痛。蚯蚓糞。水和。作稠泥團。以火燒之。令極赤。如粉。以臘月猪脂和。傅齒上。日三兩度。永差。

又方。馬齒莧一把。嚼之。卽差。

齒根動欲落。生地黃緜裹。着齒上。咋之。及咬咀。以汁漬齒根。日四五。幷咽汁。十日。大佳。

大小便難。好膠三寸。葵白一把。以水四升煮。取一升半。頓服之。卽下。

又方。葵子汁和乳汁等分。服之。立出。

大便失禁。不拘老人小兒。灸兩脚大指。去甲一寸。三壯。又灸大指奇間。三壯。

小便不通。水四升。洗甑帶。取汁。煮葵子。取二升半。分三服。

又方。胡燕糞。豉各一合。和搗丸。如梧桐子大。服三丸。日三。

又方。髮去垢。燒末一升。葵子一升。以飲服方寸匕。日三。

又方。石槽塞灰土。井花水服之。日三。

又方。服車前子末。方寸匕。日三。百日止。

卒不得小便。車前草一把。桑白皮半兩。㕮咀。以水三升煎。取一升。頓服之。

婦人卒不得小便者。杏仁二七枚。熬末。服之。立通。

又方。紫菀末。井花水服三指撮。立通。血出。四五度。服之。

大小便不利。葵子二升。消石二兩。以水五升。煮取二升。分再服。

小便不利大便數。注灸屈骨端五十壯。

胃反。食則吐。搗粟米作麪。水和作丸。如楮子大。七枚。爛煮。內酢中。細細吞之。得下便已。麪亦得用之。

胃反。食即吐出。上氣。蘆根茆根各二兩。細切。以水四升。煮取二升。頓服之。得下良。

又方。飲白馬尿。即止。

又方。淘小芥子。暴乾爲末。酒服方寸匕。日三。

又方。灸兩乳下各一寸。以差爲度。

上氣。上酥一升。獨頭蒜五顆。先以酥煎蒜黃出之。生薑汁一合。共煎令熟。空腹。温服方寸匕。

上氣嘔吐。芥子二升。末之。蜜丸。寅時以井花水服。如梧子大。七丸。日二。亦可作散。酒浸服。治臍下絞痛。脚氣入腹。困悶欲死。吳茱萸六升。木瓜兩箇。切。以水一斗三升。煑取三升。分三服。如人行十里久。再進一服。或吐或汗。或利。或大熱悶。卽差。此起死人方。

卒噎。滿口着蜜。食之。卽下。

又方。刮椿杵頭細糠。含之。卽下。

又方。老牛涎。棗核大。水中飲之。終不復噎。

齲齒及虫痛。切白馬懸蹄如米許。以緜裹。着痛處孔中。不過三度。

又方。家中法。以煑酒蠟少許。任在虫孔子中。以熱火筯烙之。令蠟融于孔。立愈。

熱病後眼暗失明。以羊膽傅之。旦暮各一。

明目令髮不落。牛膽中漬槐子。陰乾。百日。食後呑一枚。十日身輕。三十日白髮再黑。百日通神。

明目。小黑豆。每日空心呑二七粒。

又方。三月三日。採蔓菁花。陰乾。治下篩。空心井花水服方寸匕。久服。可夜讀細書。

目赤及翳。烏賊骨。鉛丹。大小等分。合研細。和白蜜如泥。蒸之半食久。冷着眼四眥。日一。

治三十年聾。故鐵三十斤。以水七斗。浸三宿。取汁。入麴釀米七斗。如常造酒法。候熟。取磁石一斤。研末。浸酒中。三日乃可飲。取醉。以緜裹磁石。內耳中。好覆頭臥。酒醒去磁石。卽差。

耳聾鳴。汁出。一二十年不差。礬石少許。以生菖蒲根汁。和。點入耳中。

耳聾。巴豆十四箇。成鍊。松脂半兩。合治。丸如黍米大。緜裹。以簪頭着耳中。一日一易藥。如硬。微火灸之。以汁出乃愈。妙。

又方。菖蒲附子等分。末之。以麻油和。以緜裹。內耳中。

又方。芥子。搗碎。以男兒乳。和緜裹。內之。

又方。作一坑。可容二升許。着炭火其中。坑似窖形。以磚覆口上。磚上作一孔。可容小指。磚孔上。着地黃一升。以木盆覆之。以泥泥盆下。勿泄。盆底上鑽一小孔。可容筯。其孔上着三重布。以耳孔當盆上。熏久。若悶。去黃水。髮裹鹽塞之。不過二三度。神効。

又方。酒三升。浸牡荊子二升。碎之。浸七日。去滓。任性服盡。三十年聾。亦差。

又方。硫黃雄黃各等分末之。緜裹。內耳中。數日。聞人語。

中風大風水氣第十二

大風半身不遂。鹽沙兩石。熟蒸。作直袋三枚。各受七斗。熱盛一袋。着患處。如冷。卽取餘袋。一依前法。數數易。百不禁差。止須羊肚釀粳米。荳白薑椒。豉等。爛煮熱喫。日食一枚。十日止。千金不傳。

百種風。灸腦後項大椎平處。兩廂量二寸三分。各灸百壯。得差。須取病人指寸量。

卒病惡風欲死。灸第五椎。名曰藏輸。一百五十壯。三百壯。便愈。

中風口僻眼急。諸藥不能差者。枳實上青。刮取末。欲至心止。得茹五升。微火炒。去溼氣。以酒一斗漬。微火暖。令得藥味。隨性飲之。大驗。治緩風急風並佳。

中風口喎。炒大豆三升。令焦。以酒三升。淋取汁。頓服之。口噤不開。亦治。

又方。大皁角一兩。去皮子。下篩。以三年大酢和。左喎塗右。右喎塗左。乾。更塗之。

卒氣短。搗韭汁。服一升。立差。

大風疾。煉松脂。投水中二十徧。蜜丸。服二兩。飢便服之。日三。鼻柱斷離者二百日服之。差。斷鹽及雜食房室。

又方。天門冬酒服。百日愈。

大風。灸百會七百壯。

腎寒。灸腎輸百壯。

中風口喎。灸手交脈三壯。左灸右。右灸左。其炷如鼠屎。橫安之。兩頭下火。

風勞毒種。疼痛攣急。桃仁一升。研。如常法。以酒三升攪和。頓服之。厚衣蓋令汗。不過三劑。

猥退風。萆麻子脂一升。酒一斗。銅鉢盛。着酒中。一日。煮之令熟。服之。

失音。濃煮桂汁。服一升。覆取汗。亦可。末桂着舌下。漸漸咽汁。

又方。濃煮大豆汁。含亦佳。無豆用豉。

歷節風。松膏一升。酒三升。浸七日。服一合。日再。數劑愈。

冷氣。氣短。蜀椒五兩。絹袋盛。以酒一斗。浸之。二七日。服之。任意多少。

卒上氣。鳴急。便欲死者。搗韭汁服一升。良。

乏氣。枸杞葉。生薑各二兩。㕮咀。以水三升。煮取一升。頓服。

心腹冷痛。熬鹽一斗。熨。熬蠶沙。燒磚石。蒸熨。取其裏溫暖。止。蒸土亦大佳。

虛勞浮腫。灸太衝百壯。又灸腎輸。

虛勞不得眠。酸棗。榆葉等分。末之。蜜丸如梧子大。每服十五丸。日再。

又方。乾薑四兩末。湯和。頓服。覆取汗。愈。

一切虛羸。鹿骨一具。碎。枸杞根。切。二斤。二味各以水一斗。別器各煎汁五升。去滓。澄清。仍合一器。共煎取

五升、日二。服盡好。將愼。皆用大斗。

補虛羸。九月十日。取生溼枸杞子一斗。酒六升。煮五沸。出取研之。熟。濾取汁。令其子極淨。暴子令乾。搗末。合前汁。微火煎。令可丸。酒服二方寸匕。日二。加至三方寸匕。亦可加至五十丸。

腹脹滿繞臍結痛。堅不能食。灸中守百壯。穴在臍上一寸。一名水分。

脹滿氣聚寒冷。灸胃管百壯。三報。穴在鳩尾下三寸。

脹滿瘕聚滯下冷痃。灸氣海百壯。穴在臍下一寸。忌不可針。

脹滿氣如水腫狀。小腹堅如石。灸膀胱募百壯。穴在中極。臍下四寸。

脹滿腎冷瘕聚洩利。灸天樞百壯。穴在臍傍相對橫。去臍兩傍各二寸。

諸冷極。馬藺子九升。淨治去土。空腹服一合。日三。飲及酒下之。服訖。須臾。以食壓之。取差乃止。

骨蒸天靈蓋如梳大。灸令黃。碎。以水五升。煮取二升。分三服。起死人神方。

又方。取人屎灰。以酒服方寸匕。日三。

走疰。燒車釭令熱。暫入水。以溼布裹熨之。

三十年氣疰。豉心半升。生椒一合。以水二升。煮取半升。適寒溫。用竹筒縮取汁。令病者側臥。以手擘大孔射灌之。少時當出惡物。此法垂死悉治。得差百千。不可具述。

欬嗽。胸脇支滿。多唾。上氣。酒一升半。浸肥皁莢兩挺。經宿。煑取半升。分三服。七日忌如藥法。若吐多。以酢飯三四口止之。

又方。薑汁一升半。沙糖五合。煎薑汁。減半。內糖更煎。服之。

又方。白糖五分。微煅令消。內皁莢末方寸合利相得。先食服。如小豆二丸。

又方。服芥子七丸。以油酒下之。

上氣欬嗽。乾羌末三兩。膠飴一斤。二味和令調。蒸五升米下。以棗大含稍稍咽之。日五夜二。

卅年嗽。百部根二十一斤。搗取汁。煎如飴。服方寸匕。日三。

又方。白蜜一斤。生羌二斤。取汁。二味先將銅銚秤知斤兩訖。內蜜。復秤知數。次內羌汁。以微火煎。令羌汁盡。惟有蜜斤兩在。丸如棗大。含一丸。日三。禁一切雜食。

又方。紫菀二兩。款冬花二兩。末之。食後以飲服方寸匕。日三。七日差。

久水腹大如鼓。烏豆一斗。熬令香。勿令大熟。去皮。爲細末。餳粥皆得。服之。初服一合。稍加之。若初服多。後即嫌臭。服盡即更造。取差止。不得食肥膩。渴則飲羹汁。愼酒肉猪雞魚生冷酢滑房室。得食漿粥。牛羊兎鹿肉。此據大飢渴時食之。可忍。亦勿食也。此病難治。雖諸大藥丸散湯膏。當時雖差。過後復發。惟此散差後不發。終身服之。終身不發矣。其所禁食物。常須少噉。莫隨意鹹物諸雜食等。

又方。葶藶末二寸匕。蒼耳子灰二寸匕。調和水服之。日二。

又方。椒目沉水者。取熬之。搗如膏。酒服方寸匕。

又方。水煮馬兜零服之。

水腫利小便。葶藶四兩。生用。桂心一兩。末之。蜜飲下梧子大七丸。日二。以知爲度。

又方。牽牛子末之。水服方寸匕。日一。利止。

又方。郁李仁末。麪。各一升。和作餅子。七枚。燒熟。空腹熱食四枚。不知更加一枚。加至七枚。

大水頭面徧身腫脹。苦瓠白穰實。捻如大豆。以麪裹。煮一沸。空腹呑七枚。至午當出水□升。三四日。水自出不止。大瘦乃差。三日內慎口味也。苦瓠須好。無厭翳細理。研□□□有毒不堪用。崔氏用子作餫飩服。二七枚。若恐虛者。牛乳服之。如此。隔日作服。漸加至三七枚。以小便利爲度。小便若太多。卽二日停止。

水通身腫。煎猪椒枝葉如餳。空腹服一匕。日三。痒。以汁洗之。

又方。苦瓠膜二分。葶藶子五分。熬。搗爲丸。如小豆大。服五丸。日三。

又方。單服牛尿。大良。凡病水無不差。服法先從少起。得下爲度。

又方。大棗肉七枚。苦瓠膜如棗核大。搗丸。一服三丸。如行十五里久。又服三丸。水出。更服一丸。卽止。

又方。煎人尿。令可丸。如小豆大。日三服。

又方。葶藶桃仁各等分。皆熬。合搗爲丸。服之。利小便。一曰。用杏仁。

又方。搗生葶藶子。酢和服。以小便數爲度。

又方。燒姜石令赤。內黑牛尿中。令熱。服一升。日一。

又方。灸足第二趾上一寸。隨年壯。又灸兩手大指縫頭。七壯。

凡卒中風口喎。以葦筒長五寸。以一頭刺耳孔中。四畔。以麪密塞之。勿令泄氣。一頭內大豆一顆。幷艾燒之。令然。灸七壯。卽差。患右灸左。患左灸右。耳病亦灸之。若不能語者。灸第三指上百壯。若眼反口噤。腹中切痛。灸陰囊下第一橫理。十四壯。人卒死者。灸法同之。

破傷風腫。厚塗杏仁膏。燒麻燭。遙灸之。

刺傷中風。水刮箭羽下漆。塗之。

又方。服黑牛熱尿一服。二升。三服。卽止。

又方。煮韭熟搨之。

又方。蠟一兩。熱灸熨。薄裹其上。水出。愈。

千金寶要卷之四

瘧痢癥等第十三

凡下痢。熱烏梅一升。黃連一斤。金色者。末之。蜜和如梧子大。二十丸。日三。夜二。

積久三十年常下痢。赤松皮去上蒼皮。切一斗爲散。麪粥和一升。日三服。百日差。

下血。日夜百七八十行。黃連黃蘗各四兩。㕮咀。醇酢三升煮。取一升半。分再服。

赤白帶下。亂髮雞子大燒末。水服。不過三。

下冷臍下攪痛。赤石脂乾薑各十兩。丸如豌豆。服十丸。日三。加至二十丸。

卒下痢。黃連五兩。生薑一斤。㕮咀。以水五升。煮取一升。頓服。未止更服。

久冷白痢。日夜五六十行。大小腹痛不可忍。好麪末五升。微熬。令和。溫清酒令熱。和麪末一升。空腹頓服。日三服。若至食時。搗蒜一升。令至熟。下薑椒調和。如常食法。惟須稠。勿加鹽。以水和麪二升作索餅。極爛。煮之。乾漉。熱內蒜齏臼中。相和。一頓食之。少與餘食。至飢時。仍準前食麪末酒。比至差不過兩日。

久冷或痢或不痢。但患腰腹苦冷者。上等新蜀椒三升。用酢宿漬之。以麪三升。和椒一升。緊拌。煮作粥。空腹頓服之。加葱豉鹽。任性調和。不差。更作。以差爲限。不過三升。椒。卽愈。此不但治冷。大治諸虛損。冷極

有所益久當自知耳。

瘧或間日或夜發者燒黑牛尾頭毛作灰酒服方寸匕日三。

又方無問新久者小便一升半蜜三匕同煮三沸頓服每發日平旦時服自至發勿食重者漸退不過三服差。

一切瘧無問遠近正仰臥以線量乳間中屈從乳向下灸度頭隨年壯男左女右。

五臟諸瘧灸尺澤七壯穴是肘約上動脈。

禳瘧法未發前抱一大雄雞時時驚動令雞作大聲立差。

卒暴癥腹中有物堅如石痛如斫刺晝夜啼呼不治百日必死牛膝二斤㕮咀暴之令乾以酒一升浸之密塞氣口煎取半服半升一服便吐去宿食神効。

又卒暴癥取商陸根搗碎蒸之以新布藉腹上以藥鋪布上以衣物覆藥上冷復易之數日勿息。

凡所食不消取其餘類燒作末酒服方寸匕便吐去宿食即差如食桃不消者以時無桃就樹間得槁桃燒服亦可。

卒食不消欲成癥積者煎艾汁如飴取半升作一服便利吐去宿食神良。

又方白艾五尺圍一束薏苡根一大把二味煎服。

食魚肉等成癥結。并諸毒氣。狗屎五升。燒末。絲裹之。以酒一斗。浸再宿。濾取清。分十服。日三服。三日使盡。隨所食便出矣。

雜中食瘀實不消。心腹堅痛。以水三升。煮白鹽一升。令消。分三服。自吐。亦治暴癥。

患癥結病。及爪病。似爪形。日月形。或在臍左右。或在臍上下。若鱉在左右肋下。或當心如合子大。先針其足。以椒熨之。取一新大盆。受一斗者。盆底鑽一百二十孔。孔上着椒三合。上着一重紙。紙上着冷灰一升。灰上着熱灰半升。上着剛炭火一斤。經一食頃。盆底熱徹。當病上。初安氈一重。即安火盆。火盆大熱。以漸更加一重。若火更熱不可忍。加至三重。暫歇一口。冷飲。還上火。消二分許。則停。經三日。□□及至七日。決得頓差。然後食美食自補。若小不差。作露宿丸。服之。方在第十六卷中。

鱉癥。腹堅硬。腫起大如盆。眠臥不得。取藍一斤。搗水三升。絞取汁。合一升。日二。

又方。蒴藋根。白芨一握。研取汁。水和服之。

食□得病爲鱉癥。在心下堅強。雞屎一升。炒黃。取五合。以酒一升。浸半爲末。以所浸酒。服方寸匕。日二三日中作一劑。

蛟龍病。開皇六年三月八日。有人食芹得之。其人病發。似癲癇。面色青黃。因食寒食餳。過多。便吐出蛟龍。有頭及尾。從茲有人患此疾。令服寒食餳二斗。大驗。

米癥常欲食米若不得米則胸中清水出雞屎一升白米五合合炒令米焦搗末以水二升頓服取盡須臾吐出病如研米若無米當出痰自此永憎米不復食

頭風吐逆第十四

凡食後吐酸水乾薑茱萸各二兩治篩酒服方寸匕日二胃冷服之立驗

嘔噦蘆根切三升以水一斗煮取四升分四服

乾嘔吐逆涎沫出者半夏乾薑等分㕮咀以漿水一升半煮取七合頓服之日三

乾嘔酒浸馬屎一宿取汁服之

又方灸心主尺澤亦佳

又方灸乳下一寸三十壯

乾嘔不止粥食湯藥皆吐不停灸手間使三十壯若四厥脉沈絕不至者灸之便通此起死人法

治噦煮豉三升飲汁佳

又方空腹飲薑汁一升

又方濃煮蘆根汁飲之

又方灸承漿七壯炷如麥大又灸臍下四指七壯

惡心苦瓠穰并子一升碎以酒水三升煮根一升頓服須臾吐下如蝦蟆衣三升。

又方服小便百日佳

又方麻子一升熬令香熟搗取酒三升熟研濾取一升飲盡日二服盡□石差一切病自能食飲不能酒者任性多少

食飲輒吐頓服生熟湯三升即止

吐逆食不住灸胃管百壯三報

吐逆飲食卻出灸脾募百壯三報章門也

咽痛逆氣不能食麻子一升熬令黑以酒一升淋取汁空心一服一升漸至二升多汗好覆勿觸風冷此方兼理產婦及丈夫中風如角弓反張口噤不開

治婦人氣平旦服烏牛屎日一止

腰痛以酒單服鹿茸與角方寸匕日三

腰臂痛導引法正東坐收手抱心一人于前據躡其兩膝一人後持其頭徐牽令偃臥頭到地三起三臥止便差

腰痛灸法宜針決膝腰句尺一中青赤路脉出血便差

又方。灸脚跟上。横文中。白肉際。十壯。良。

又方。灸足巨陽七壯。巨陽在外踝下。

又方。灸腰自窌七壯。在尻上約左右。

又方。灸八窌。及外踝上骨約中。

腰卒痛。灸窮骨上一寸。七壯。左右各一寸。七壯。

頭風。大豆三升。炒令無聲。先以一斗二升瓶。盛清酒九升。乘豆熱。卽傾酒中。密泥頭。七日。温服之。

又方。服荆瀝。不限多少。取差止。

又方。搗蒴藋根一升。酒二升。漬服。汗出止。

又方。末蔓荆子二升。酒一升。絹袋盛。浸七宿。温服三合。日三。

又方。臘月烏雞屎一升。炒黄。末之。絹袋盛。以酒三升浸。温服。任意。常令醺酣。

又方。七月七日麻勃三升。麻子一石。末相和。蒸之。沸湯一石五斗。三徧淋之。煑取一石。神麯二十斤。漬之。令發。以黍米兩石五斗釀之。熟封。三七日服清。一升百日。身中澀。皮入風。胸膈。五臟骨髓伏風百病。悉去之。

頭風。沐方。葶藶子煑沐。不過三四度。愈。

又方。蜀椒二升。以水煮。取汁沐髮。良。

白屑。以桑灰汁沐頭。去白屑。神良。

白髮還黑。烏麻九蒸九暴。末之。以棗肉丸。久服之。佳。

又方。隴西白芷。旋覆花。秦椒。各一升。桂心一尺。治下篩。以井花水服方寸匕。日三。三十日。白髮還黑。禁房室。

千金寶要卷之五

疫瘴渴淋第十五

令瘟不相染人。汲水瓶上繩。長七寸。盜着病人臥席下。良。

又方。以繩度所住戶中壁。屈繩則斷之。

又方。桃木蠹屎末之。水服方寸匕。

又方。木豉等分。酒漬服之。妙。

又方。正旦。呑麻子赤小豆各三七枚。又以二七枚投井中。

又方。新布袋盛大豆一升。內井中。一宿。出服七枚。

又方。松葉末之。酒服方寸匕。日三。

又方。常以七月七日。合家向日。呑赤小豆二七枚。

又方。常以七月七日。男呑大豆七枚。女呑小豆二七枚。

又方。正旦。取東行桑根。大如指。長七寸。以丹塗之。挂門戶上。又令帶之。

又方。常以月望日。細剉東引竹枝。煮湯浴。

瘴氣。蒜五子并皮碎之。豉心一升。以三歲男兒尿二升。煮五六沸。去滓。服之良。

又方。青竹茹二升。以水四升。煮取三升。分三服。汗不止者。白朮葉作飲。方寸匕飲□

盜汗。韭根四十九枚。水二升。煮一升。頓服。

又方。豉一升。以酒二升漬。三日。若服不差。更合。服不過三劑。

消渴。甘草乾薑各二兩。㕮咀。水三升。煮取升半。去滓。分二服。又法。有大棗十二箇。

渴利。生栝蔞根三十斤。切。以水一石。煮取一斗半。去滓。以牛脂五合。煎。水盡。以溫酒食。如雞子大。日三服。

渴口便利。復非淋。榆白皮二斤。切。以水一斗。煮取五升。一服三合。日三。

又方。小豆藿一把。搗取汁。頓服三升。

又方。薔薇根。水煎。服之佳。

又方。三年重鵲巢。燒末。以飲服之。

又方。桃膠如彈丸。含之。咽津。

又方。蠟如雞子大。以酢一升。煮二沸。適寒溫。頓服之。

熱渴頭痛壯熱。及婦人血氣上衝。悶不堪者。茅根切三升。搗取汁。渴即飲之。令盡。

消渴病。百日以上者。不得灸刺。

消渴。乾浮萍、栝蔞根、等分。末之。以人乳汁和丸如梧子。空腹。飲服二十丸。日三。三年病者三日愈。治虛熱。大佳。

治渴。黃連一斤。生地黃一斤。又云十斤。絞地黃。取汁。浸黃連。出。燥。曝之。燥。復內之。令汁盡。乾之。搗末。蜜丸如梧子。每服二十丸。日三。食前後無在。亦可爲散。以酒服方寸匕。

大渴。深掘大栝蔞根。厚。削皮至白處。以寸切。水浸一日夜。易水。經五日。取出。爛搗。研之。以絹袋。濾之。如出粉法。乾之。水服方寸匕。日三四。亦可粥。乳酪中食之。不限多少。取差止。又云。水和栝蔞散。服方寸匕。亦可蜜丸如梧子大。每服三十丸。

又方。取七家井索。近桶口結。燒作灰。井花水服之。不過三服差。

又方。取豉漬汁。任性多少飲之。

又方。濃煮竹根。取汁飲之。以差止。

又方。以青粱米煮。取汁飲之。以差止。

消中。日夜尿七八升者。鹿角炙令焦。以酒服五分匕。日三。漸加至方寸匕。

又方。溫麻汁。服一升。佳。

又方。葵根如五升盆大。兩束。又云五六斤。以水五斗煮。取三斗。宿。不食。平旦每服三升。

諸淋細白沙三升熬令極熱以酒三升淋取汁服一合

淋痛蒲黃滑石等分末之酒服方寸匕日三

氣淋船底胎如鴨子大水三升煮取二升頓服

又方水三升煮豉一升一沸去滓內鹽一合頓服亦可單煮豉汁服

又方水一斗煮比輪錢三百文取三升溫服之

又方搗葵子末湯服方寸匕

又方空心單茹蜀葵一滿口止

又方熬鹽熱熨小腹冷復易亦治小便血

又方臍中着鹽灸三壯

石淋車前子二升絹袋盛水九升煮取三升頓服之石卽出先經宿不得食

又方取浮石使滿一手治下篩以水三升酢一升煮取二升澄清服一升不過三服石出亦治嗽醇酒煮之

又方桃膠棗許大夏以三合冷水冬以三合湯和一服日三當下石子如豆卵石盡止亦治小便出血

又方灸水泉三十壯足大敦是也

膏淋。搗葎草汁二升。酢二合。空心頓服之。當尿小豆汁也。又濃煮汁飲。亦治淋瀝。

熱淋。葵根一升。冬用子。夏用苗。切。大棗二七箇。以水三升。煮取一升二合。分二服。熱加黃芩一兩。出難。加滑石末二兩。血者。加茜根三兩。痛者。加芍藥二兩。加藥水亦如之。

又方。白茆根。切。四斤。以水一斗五升。煮取五升。服一升。日三夜二。

又方常煮冬葵根飲之。

血淋。生大麻根十箇。以水五升。煮取二升。頓服之。亦治小便出血。

又方。大豆葉一把。水四升。煮二升。頓服之。

又方。葵子一升。水三升。煮取汁。日三服。亦治虛勞尿血。

又方。灸丹田。隨年壯。又灸伏留五十壯。又云隨年壯。

五淋。灸懸泉十四壯。穴在內踝前一寸。斜行脈上。是巾封之別名。

又方。灸大敦三十壯。

卒淋。灸外踝尖七壯。

小便血。胡麻三升。搗細末。以東流水二升。漬一宿。平旦。絞去滓。煮兩沸。頓服之。

小便出血。龍骨。細末之。溫水服方寸匕。日五六服。一云酒服。

又方。搗荊葉取汁。酒服二合。

又方。酒三升。煮蜀當歸四兩。取一升。頓服。

又方。煮車前根葉子。多飲之。佳。

又方。刮滑石末。水和傅。繞小腹。仍繞陰際。佳。又治小便不通。

又方。酒服亂髮灰。一云水服。

又方。酒服葵莖灰方寸匕。日三。

頭面手足瘰癧瘡漏第十六

凡口吻瘡。以經年葵根欲爛者。燒作灰。熱傅之。佳。

燕吻瘡。白楊枯枝。鐵上燒。取湍。及熱傅之。佳。

唇上瘡。經年不差。八月藍。取汁。洗三日。差。

諸瘡因風致腫。燒白芋灰。溫湯調之。傅上。厚三分。乾即易。不過五度。差。

又方。櫟根皮三十斤。剉。水三斛。煮令熱。下鹽一把。令的的然熱。以浸瘡。當出濃血。日日爲之。差。止。

反花瘡。并積年諸瘡。取牛蒡根。一云牛勞根。熟搗。和臘月猪脂。封上。差止。

又方。馬齒菜搗封。差止。

惡露瘡。搗薤菜傅瘡口。以大艾炷灸藥上。令熱氣入內。卽差。

惡瘡。燒扁竹灰。和楮白汁。塗之。

又方。羊屎、麻根。燒煙斷。膏和封。有汁。乾傅。

惡瘡似火爛。白馬屎暴乾。以河水調。煮十沸。絞取汁。洗之。

身瘡頭瘡。菖蒲末傅上。日三。夜二。

惡瘡十年不差。似癩。蛇脫皮一枚。燒末之。猪脂調。傅。醋調。亦得。

又方。苦瓠一枚。咬咀。煮取汁。洗瘡口。日三。又煎。以塗癬。甚良。皆先以泔。洗。三日差。

又方。鹽湯洗。搗地黃葉貼之。

又方。燒猳猪屎。傅之。

又方。燒萆茛子末。傅之。

諸瘡久不差。并六畜瘡。棗膏三升。水三斗。煮。取一斗半。數洗。取愈。

代指。甘草二兩。咬咀。水五升。煮取一升半。漬之。若無。用芒硝代之。

又方。以唾調白礜砂。搜麪。作椀子。盛唾。着礜砂如棗大。以爪指着中。一日差。

又方。以毛雜黃土作泥。泥指上。令厚五分。內糖灰中煨。令熱可忍。泥乾易。數度差。

又方。刺指。熱飯中二七徧。愈。

又方。以麻沸湯漬之。卽愈。

又方。單煮地榆湯。漬之半日。差。

又方。先刮去膿血。炙魚鮓皮。令溫。以纏裹周匝。痛止。便愈。

又方。蜀椒四合。水一升。煮三沸。以漬之。

又方。取萎黃茇葉。煮湯漬之。

指痛欲脫。猪脂和鹽煮令消。熱內其中。食久住。千金翼作和乾薑。

手足指擊痛。醬清和蜜。溫塗之。

又方。灸指端七壯。

手足指逆臚。此緣廁上搔頭。還坐廁上。以指倒捋二七下。卽差。

凍指。馬屎三升。以水煮令沸。漬半日。愈。

人脚冬夏常拆裂。雞屎一升。水二升。煮數沸。停小冷。漬半日。差。亦用馬糞。

又方。羊膠。膠乾。故帛貼上。

九漏成鍊松脂。末之。塡瘡孔。令滿。日三四度。七日差。

又方馬齒莧陰乾臘月燭燼等分末之以臘月猪脂調先以暖泔清洗瘡拭乾傅之日三

又方乾牛屎乾人屎搗先幕緜于瘡上緜上着屎蟲聞屎香出若癢卽舉緜去之更取緜着屎如前蟲出盡乃至

又方苦瓠四枚大如盞者各穿一孔如指大置湯中煑十數沸取一竹筒長一尺內一頭瓠孔中一頭注瘡孔上冷則易之徧止

又方煑鹽花以麪摊病上內鹽花麪匡中厚二寸其下以桑葉三重藉鹽候冷熱得所可忍冷則無益熱則肉破一日一度候病根勢消則止若已瘡者搗穄穀末粉之

又方槲北陰白皮三十斤剉之以水一石煑取一斗去滓煎如糖又取都廁上雌雄鼠糞各十四枚燒令汁盡末內煎中温酒一升投煎中合攪之羸人五合服之當有蟲出

漏作瘡孔末露蜂房臘月猪脂調傅孔上

瘡因風致腫櫟木根皮一斤濃煑入鹽一把漬之

灸瘡不差者每日于上別灸六七壯自差

灸瘡中風冷腫痛但向火灸之瘡得熱則瘡快至痛止日六七灸愈

諸漏霜下瓠花暴乾末傅之

又方。搗土瓜根。薄之。燥則易。不限時節。

又方。故布裹鹽如彈丸。燒令赤。末酒服。

又方。服白馬屎汁一升。

又方。正月雄狐屎。陰乾。末之。水調服。

又方。鹽麪和。燒灰傅之。

又方。水研杏仁服之。

又方。猪脂一升。酒五合。煎沸。頓服之。

漏下。槐子燒末。酒服方寸匕。日三。立差。

一切冷瘻。燒人吐出蛔蟲爲末。先以甘草湯洗瘡。後着灰。無不差者。慎口味。

鼠漏。瘡差復發。以不經水猪脂。咬咀。生地黃。內脂中。令足相淹。和煎。六七沸。桑灰汁洗瘡。去惡汁。以此膏傅。日一易。

鼠漏腫。核未成膿。以柏葉着腫上。熬鹽着葉上。熨之。令熱氣下。卽消。

螻蛄瘻。槲葉灰。先以泔清煑槲葉。取汁。洗。拭乾。以灰內瘡中。

蜂瘻。瘻漸大者。熬鹽熨之。三宿。四日不差。至百日成瘻。其狀大如四五寸石。廣三寸。中生蜂作孔。乃有數

百。以石硫黃隨多少。然燭燒令汁出。着瘡孔中。須臾間見蜂數十。惟蜂盡。差。

又方。人屎。蛇脫灰。臘月猪膏。調傅之。

又方。蜂窠灰。臘月猪脂。調傅孔中。

瘰癧瘻。雄雞屎灰。臘月猪脂。調封之。

蜣蜋瘻。牛屎灰。和臘月猪脂。傅之。

又方。蜣蜋所推丸。末。傅之。

又方。乾牛屎末。傅瘡。則撥卻。更厚封。差止。

又方。熱牛屎。塗之。數數易。應有蜣蜋出。

蚯蚓瘻。蚯蚓屎。雞屎。末之。用社猪下頷膸。和傅之。

蝎瘻。五六孔相通者。搗茅根汁。着孔中。

蛇瘻。蛇脫皮灰。臘月猪脂。和封之。

顛當瘻。搗土瓜根。傅至差。愼口味。

雀瘻。取母猪屎灰。和臘月猪脂。傅瘡。蟲出如雀形。

膽瘻。桃花末。和猪脂封之。佳。

石瘻。兩頭出。令人寒熱。搗槐子。和井花水。封之。

灸漏法。葶藶子二合。豉一升。搗令極熟。作餅。如大錢厚二分許。取一枚。當瘡孔上。作大艾。炷如小指大。灸餅上。三炷一易。三餅九炷。隔三日復一灸之。如是頭瘡。不可灸。葶藶氣入腦殺人。

又方。七月七日。日未出時。取麻花。五月五日取艾。等分。合搗作炷。用灸瘡上百壯。亦灸瘰癧。

九漏。灸肩井二百壯。

又方。灸鳩尾骨下。宛宛中。七十壯。

又方。遶四畔灸。差。

諸惡漏。中冷息肉。灸足內踝上三壯。二年六壯。

瘰癧。白殭蠶。治下篩。服五分匕。日三。十日差。

又方。故鞋氈替燒末。五匕。和酒一升。平旦向日服之。行須臾。吐鼠三。朝服。

又方。狼屎末。傅之。

又方。五月五日取一切種種雜草。煮汁洗。

一切瘰癧。及觸處但有肉結凝。似作瘻及癰節者。以獨頭蒜。截兩頭。留心大。作艾炷。隨蒜大小。貼癧子上。灸之。勿令上破肉。但取熱而已。七壯一易。日日灸之。取消止。

瘻癧灸兩胯裏患癧處宛宛中日一壯七日止神驗

又方灸五里人迎各三十壯

又方灸背兩邊腋下後文上隨年壯

又方灸耳後髮際直脈上七壯

去面黚黯成鍊松脂爲末溫酒服三合日三服盡三升無不差

又方白附子末酒和傅之卽落

脚氣腫已入胻至小腹脹小便澀少取烏特牛尿一升一服日二取消乃止又云羸瘦人二分尿一分牛乳合煮乳結服

口中瘡久不差入胸中並生瘡三年已上不差者濃煎薔薇根汁含之又稍稍咽之日三夜一冬用根夏用莖葉

又方角蒿灰傅之一宿知二宿差有汁吐不得咽也

癬搗刺薊汁服之又服地黃汁佳又燒蛇脫一具酒服又服驢尿良又搗萇菪根蜜和傅之一無根字

又方熱搗煎餅不限多少日一徧薄之良

又方醋煎艾塗之

又搗羊蹄根和乳塗之。

瘿昆布二兩洗切如指大酢漬含咽汁盡愈。

又方海燕一斤又云三兩小麥麪一升以三年酢一升麪末暴乾往反酢盡搗爲散酒服方寸匕日三忌努力。

瘿上氣短氣灸肺輸百壯。

瘿上氣胸滿灸雲門五十壯。

肉瘤勿治治則殺人又云不得針灸。

陰癩取楊柳枝脚指大長三尺二十枚水煑令極熱以故布及氈掩腫處取熱柳枝更互柱之如此取差。

浸淫瘡以煎餅乘熱搨之亦治溼癬。

又方猪牙車骨年久者椎破燒令脂出熱塗之。

又方取苦練皮或枝燒作灰傅乾者猪膏塗幷治小兒禿瘡諸惡瘡。

瘮瘡酢一升温令沸以生薤一把內酢中封瘡上差止。

又方炒臘月糟薄之。

又方燒故履系末傅之。

又方燒松根取脂塗之

燥瘡瘡酢和灰塗之又熱牛屎塗之

瘡疥瘡癢不可堪羊蹄根淨去土細切熟熬以酢和熟搗淨洗瘡傅上一時間以冷水洗之日一又陰乾作末癢時搔汁出以粉之又以生茇根揩之

又方灸足大指奇間二七壯灸大指頭亦佳

白殿平旦以手掉取韭頭露塗之極效

痔第十七

痔以蒲黃水服方寸匕日三良又取桑耳作羹空腹飽食之三日食佳

痔下血及新產漏下好礬石一兩附子一兩末之白蜜丸如梧子大酒服二丸日三稍加不過數日便斷

百日服之終身不發一方有乾薑一兩

五痔十年者塗熊膽取差止一切方皆不及此神良

又方七月七日多採槐子熟搗取汁內銅器中重緜密蓋着宅中高門上暴之二十日已上煎成如鼠屎大內穀道中日三亦主瘻及百種瘡

又方痔下血及新產漏下常食萹竹葉及煮羹粥大佳

又方。虎頭犀角。末之。如雞子大。和不經水猪脂。大如雞子。塗瘡上。取差。

五痔。取槐根。煮洗之。

又方。取桃根。煮洗之。

痔。出膿血。有蟲。傍生孔竅。槐白皮一擔。剉內釜中。煮令味極。出置大盆中。適寒溫。坐其中。如浴狀。蟲悉出。冷又易之。不過二三。卽差。

久冷五痔便血。灸脊中百壯。

五痔便血失屎。灸回氣百壯。穴在脊窮骨上。

肛出。女萎一升。以器中燒。坐上熏之。卽時入。

脫肛。蒲黃二兩。以猪脂和。傅肛上。內之。二三愈。

腸隨肛出者。生栝蔞根。取粉。以猪脂爲膏。溫塗。隨手抑按。自得縮入。

冷痢脫肛。枳實一枚。石上磨。令滑澤。鑽。安柄。蜜塗。炙令煖。熨之。冷更易之。取縮入止。

又方。鐵精粉。內上。按令入。卽愈。

又方。生鐵三斤。以水一斗。煮取五升。出鐵。以汁洗口。再。

因寒冷脫肛。灸臍中。隨年壯。

又灸橫骨百壯.

又方.灸龜尾七壯.卽後竅骨是也.

千金寶要卷之六

千金論曰上醫醫未病之病中醫醫欲病之病下醫醫已病之病思以謂知病于未病之前者此上智之所能也知病于欲病之初者此中智之所及也若夫已病而求醫則常情同然不必論其智不智也孫氏曰聖人設教欲家家自學人人自曉尊親有疾不能療之者非忠孝也斯言可謂切至矣

氣不調百病自生衆病積聚皆起于虛又曰虛生百病藥石有相欺者入人腹中遂相鬬爭力甚刀劍言不知性氣者不可服也凡服食藥餌須量自己性理所宜不可見彼得力我便服之人患瘡痍未瘳不得合陰陽

婦人妊娠食羊肝令子多厄食山羊肉令子多病食驢肉延月食兎犬肉令子無音聲并缺唇食騾肉產難食雞子及乾鯉魚令子多瘡食椹并鴨子令子倒出食雀肉并豆醬令子面多黟黯黑子食雀肉飲酒令子心淫情亂不畏廉恥食鱉令子短項食冰漿絕胎多經大驚者生子患癲向非常地大小便必半產殺人穢汚死喪家人來看視產婦則難產傷兒不依產圖令子母多妨產乳若在反支月者浣濯水以器盛出此忌月方覆之產婦人衆看則難產臨產憂悒則難產兒已生不得自視穢汚便利于懸厠之上成十二痼疾產後百日內勿行房大忌上厠只室中上盆佳暑月產臥忌取涼百日忌服轉瀉藥月經不去

大忌合陰陽。生十二疾。臥濕冷地。大忌合陰陽。生十二疾。大忌以冷水洗浴合陰陽。生十二疾。小兒初生。不以緜裹指。拭口中青泥惡血。則入腹。生百病。初生舉之遲。則中寒。臍帶。隔衣咬斷之。不得以刀子截。臍帶留至足跌。短則中寒下痢。斷臍後浴者。水入臍。令兒腹痛。臍帶中多有蟲。不去之。則入腹成疾。臍留六寸。長則傷肌。短則傷臟。臍不以時截。及按汁不盡。則寒生臍風。兒生。男以父。女以母。故衣裹之。過厚。皮膚害血脈。發雜瘡而黃。新生兒衣暖大厚。令筋骨緩弱。解脫兒臍。及換衣。如冬月。須閉戶。生三日。朱蜜食多。則脾胃冷。腹脹。喜陰癎。氣急變噤。而乖。臍帶瘡未愈。數洗浴。令兒患陰頹。兒太飽則吐。及風中臍。夏不去熱乳。令兒嘔逆。冬不去寒乳。令兒欬痢。母新房。以乳兒。令兒羸瘦。交脛不能行。母有熱。以乳兒。令變黃不能食。母怒以乳兒。令喜驚發氣疝。又令上氣。顛狂。母新吐下以乳兒。令兒虛羸。母醉以乳兒。令兒身熱。腹滿。乳兒當極挼散其熱氣。勿令奔出。乳兒不得用宿乳。母欲寐。則不得乳兒。恐失飢飽。及塡兒口鼻也。浴兒水不冷熱得所。則令兒驚。亦致五臟病。（兒多不可）兒多不可久浴。久浴則傷寒。夏不可久浴。久浴則傷熱。數浴背冷。則發癎。小兒不浴。又令兒毛落。衣暖至汗出。卻外風入腹。爲病。因驚怖大啼。多爲病因。先不哺乳。吐而變熱者。爲癎。新生無病。懼。不可逆針灸。衣甚薄。則乳食不消。大便醋臭。此欲爲癖也。乳哺食節作疾。新生一歲兒。外人來。氣息忤之。則爲客忤。病。雖是家人。或別房異戶。從外還者。不避之。爲客忤。雖是乳母。及父母從外來。亦能令兒爲客忤。一應親戚。及外來人。有衣服。經履鬼神。麤惡暴氣。或牛馬之

氣。并能令兒爲客忤。一應人執作喘息。及乳母乳氣未定者。并能爲客忤。乳母遇醉。及房勞。喘後乳兒最劇。能殺兒。凡諸乘馬行。得馬汗氣息。未盥洗。易衣裝。而便向兒邊者。令兒中馬客忤。一歲兒勿見馬來。及聞馬鳴驚。能令兒作客忤。兒衣布帛。襁中及履中。不得有頭髮。白衣不得用青帶。青衣不得用白帶。皆能爲客忤。凡非常人。及諸物從外來。亦驚小兒。致病。欲防之法。當將兒避之。若不避者。當燒牛屎。令常有煙氣。置戶前則善。秋初夏末。晨夕暴冷。不避之。多患肚熱下痢。小兒解着傷風。亦作傷寒病。尋常晚夜。及陰雨夜。小兒衣物。不得在露地。有釣星鬼。禽喜落毛羽于人中庭。置兒衣中。便令兒作癎病。必死。七八月。尤忌。兒生未能行。而母再有娠。使兒飲此乳。作鬾病。小兒飲食過度。不知自止作疾。小兒夏月積冷。洗浴過度。及乳母亦將冷水洗浴。以冷乳飲兒。兒壯熱。忽値暴雨涼。卽令兒病痢等。夏月暴寒。小兒不避之。入胃則暴病。中客忤。心腸脹滿。刺痛。口噤。氣急停屍。卒死者。服張仲景備急丸。

人失明之本。有十六件事。生食五辛。接熱飲食。熱食麪食。飲食不已。房室無節。極目遠視。數看日月。夜視星火。夜讀細書。月下看書。抄寫多年。雕鏤細作。博奕不休。久處煙火。泣淚過多。刺頭出血過多。又由馳騁田獵。冒涉風霜。迎風追獸。日夜不息之所致也。

地因寒暑風溼。皆作蒸氣。人足履之。謂之風毒。名爲脚氣。婦人產後。尤宜愼此。四時之中。不得久立久坐溼冷之地。令人作脚氣病。酒醉汗出。脫衣靴襪。當風取涼。皆成脚氣。患脚氣人。忌大怒。忌房室。忌牛羊肉

蒜。蕺。菜。菘。蔓菁。瓠子。酒麪。酥油。乳糜。猪。雞。鵝。鴨。不得犯之。一方用鯉魚。外魚亦忌。又忌生果酸酢之食。宜食生牛乳。與生栗子。及粳粱粟米。醬豉。葱韭薤。椒。薑。橘皮。

病有三患。一患覺之晚。二患驕狠恣傲。三患狐疑不決。犯之多枉傷性命。故曰法爲信者施。不爲疑者設。欲臨近亡人。宜將少金牙散塗鼻孔耳門。及視疾者亦然。亦宜帶絳囊一方寸匕。男左女右。

新食畢取風者。令人患胃風。因醉取風者。令人患漏風。新沐浴畢取風者。令人首風。新房室畢取風者。令人患內風。尊貴人骨弱肌膚盛。因疲勞汗出。偃臥不時動搖。被微風所及。得血痺疾。凡常之日。忽然暴熱。頓取涼快意。生病。亦然。暴寒亦然。

冬時嚴寒。最宜周密。若觸冒之者爲傷寒。四時之氣皆能爲病。其傷寒尤重。以其殺厲之氣故也。辛苦之人。春多患溫病。以冬時多觸冒寒冷所致。時行之氣。犯之多病。所謂時行之氣者。春時應暖而反大寒。夏時應熱而反大冷。秋時應涼而反大熱。冬時應寒而反大溫。凡熱病。大病。新差之後。食猪肉。及羊血肥魚油膩等物。必大下痢。醫所不能治。食餅餌粢黍。飴哺。鱠炙。棗栗諸果物。脯脩。及堅實難消之物。胃氣尚虛弱。不能消化。必更結熱。下之則大痢難禁。不下之必死。下之復危。皆難治也。不可不慎。但得食糜粥。寧少食。令飢勿飽。不得他有所食。引日轉久。可漸食羊肉白糜。若羹汁。雉兎鹿肉。不可食猪狗肉。當靜臥。勿早起。梳頭洗面。非但不可體勞。雖言語亦不得多。亦不得生心用意煩勞。凡上氣事。並令人勞復。女勞當舌

吐數寸而死。凡差未滿百日。氣力未平復。而以房室者。略無不死。未滿五日。食一切肉麪。病更發。大困。食生魚鮮。下痢必不止。食生菜。令人顏色。終身不平復。病新汗解。飲冷水者。損心胞。令人虛。補不復。食生棗及羊肉者。必膈上作熱。蒸食犬羊等肉者。骨中蒸熱。食魚肉與瓜生菜。令人身熱。食鱠者病發必大困。早起勞多。及美飲食過多。致發欲死。

穀疸者。由失飢大食。胃氣衝熏所致。酒疸者。由大醉當風。入水所致。女勞疸者。由大勞大熱。而交接畢入水所致。黃疸。有人以竹筒使人極吹病人鼻中者。無不死。大愼之。

夏傷暑。至秋作瘧。冬中于風。寒氣藏于骨髓中。至暑有所用力。腠理開。又中邪氣。能作瘧。肺有熱。因有所作。用力。腠理開。能令作瘧。

交接損。令人卵縮筋攣。

食生物。令蟲卵生入腹者。成蟲蛇及魚鼈。勞倦。或飲食過常。作吐血。

服藥吐利後。常須閉口少語。于無風處。溫牀暖食。將息。

凡人執作。汗出當風。因以房室過度。醉飲飽滿行事。令心氣逼迫。短氣脈悸。得風癲病。

熱沐髮而濕結之。腦汗未止。得濕癲病。

因大驚。及當風從高墜下。致喜悲善恐怖。如有鬼物患。

有所擊仆若醉飽入房汗出當風則必傷脾

凡患痢服止藥初間痢須轉劇愚人不能便不服其藥此誤也但服不過再三服之痢病通忌生冷酢滑猪雞魚油乳酪酥乾脯醬粉鹽所食諸食皆須大熟爛爲佳亦不得傷飽

凡疳鹽醬酢酥油棗皆忌惟白飯豉苜蓿苦苣蕪菁不在禁限

凡日月蝕時忌食飲腹中生蠶蟲及房室生子不具足必患月蝕瘡日月蝕不得與兒乳日月生後乃不忌令人口臭齒斷宣露常有血出舌上生瘡

飲酒當風入肺膽氣妄泄即令人目青氣喘酒客勞倦當風喜怒氣含于肺面目黃腫即頭眩欬逆上氣時忽忽欲絕心下弦急不能飲食或吐膿血胸痛引背支滿欲嘔

七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣此七種氣積聚堅大如杯若拌在心腹中疾痛不能飲食時來時去每發欲死如有禍祟

尸疰鬼疰者即五尸之中尸疰也又挾諸鬼邪爲害者也其大略令人寒熱淋瀝沉沉嘿嘿不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至于死死後復注易傍人乃至滅門覺如此候宜急療之

人有九蟲其蟲凶惡人之極患也常以白筵草沐浴佳根葉皆可用既是香草又尸蟲所惡也凡服補藥及治諸病皆須先去諸蟲并痰飲宿癖醒醒除盡不爾必不得藥力脾勞熱有蟲在脾中令人好嘔肺勞

熱生蟲在肺腎勞熱四肢腫急有蟲曰蟯蟲如菜中蟲在腎人得傷寒及天行熱病腹中有熱及人食少腸胃空虛若齒斷無色舌上盡白甚者唇裏有瘡四肢沉重忽忽喜眠當數看其上唇內有瘡唾血唇內如粟瘡者心內懊憹痛悶者此有三蟲在上蝕其五臟下唇內生瘡者其人喜眠此蟲在下蝕其下部人不能知可服蝕蟲藥不爾蠶蟲殺人熱病蛄毒令人喜寐不知痛處而面赤如醉下利膿血當數視其人下部大小之孔稷稷然亦則是蠶蟲也劇能殺人

若有所用力舉重若入房過度汗出如浴水則傷腎人因身勞汗出衣裏冷濕久而得腎著之病身體重腰以下如帶五千錢腰中冷如冰又其人本來不吃忽然蹇吃而好嗔恚反常性此腎之傷也取寒眠地臥冷濕地氣所傷則腰痛墜墮傷腰則腰痛房室後用則腰痛肝傷善夢心傷善忘脾傷善飲肺傷善痿腎傷善唾骨傷善飢肺傷善嗽遠思強慮傷人憂恚悲哀傷人喜樂過度傷人忿怒不解傷人汲汲所願傷人戚戚所患傷人寒暄失所傷人

五勞七傷有小腹急痛膀胱虛滿手足逆冷食飲苦吐酸痰嘔逆泄下少氣目眩耳聾口焦小便自利者虛損少氣腹脹內急拘引小腹至冷不得屈伸不能飲食寒熱頭痛手足逆冷大小便難或復下痢口乾夢中泄精或時吐逆恍惚面色枯瘁又復微腫百節酸疼者

五勞七傷虛羸不足面色黎黑手足疼痛久立腰疼起則目眩腹中懸急而口絕傷外引四肢者

虛勞寒口。飲在脇下。決決有聲。飲已如從一邊下。決決然也。有頭並衝皮起引兩乳內痛。裏急。善夢失精。氣短。目眩眩。忽忽多忘者。

五勞七傷。小腹急。臍下膨亨。兩脇脹滿。腰脊相引。鼻口乾燥。目暗眩眩。憒憒不樂。胸中氣急。逆不下飲食。莖中策痛。小便黃赤。尿有餘瀝。夢與鬼神交通。去精驚恐。虛乏者。

凡男女有因積勞損。或大病後不復常。苦四體沉滯。骨肉酸疼。吸吸少氣。行動喘惙。或小腹拘急。腰背強痛。心中虛悸。咽乾唇燥。面體少色。或飲食無味。陰陽廢弱。悲憂慘戚。多臥少起者。

有大勞。虛劣。寒熱。嘔逆。下焦虛熱。小便赤痛。客熱上熏。頭痛。目疼。骨肉痛。口乾者。

有虛勞不足。四肢煩疼。不欲食。食則脹。汗出者。

有虛勞少氣。胸心淡冷。時時驚惕。心中悸動。手脚逆冷。體常自汗。腸鳴風濕者。

有虛勞損。羸乏。欬逆。短氣。四肢煩疼。腰背引痛。耳鳴。面黎黑。骨間熱。小便赤黃。心悸目眩者。

有大虛不足。小便數。噓吸。焦燒。引飲。膀胱滿急者。

有左脇氣衝。膈上滿。頭上有風。如蟲行。手足頑痺。鼻塞。脚轉筋。兩目時腫痛者。

有虛損。短氣。咽喉。凝唾不出。如膠塞咽喉者。

有五勞六絕。其心傷者。令人善驚。妄怒。無常者。

有五勞六絕。其脾傷者。令人腹滿喜噫。食竟欲臥。面目痿黃者。

有五勞六絕。其肺傷者。令人少精。腰骨痛。四肢厥逆者。

有五勞六絕。其肝傷者。令人少血。面黑者。

有五勞六絕。其腎傷者。有積聚。少腹腰背滿痺。欬唾。小便難者。

六絕之爲病。皆起于大勞。脈虛。外受風邪。內受寒熱。令人手足疼痛。膝以下冷者。

有五勞六絕。腹中雷鳴。時時泄痢者。

有五勞六絕。或閉或痢。面目腫。心下憒憒不欲語。憎聞人聲者。

有五勞七傷。八風十二痺。無有冬夏。悲憂憔悴者。凡是病。皆須服之者。

有虛勞百損者。

有五勞六極七傷虛損者。

男子女人虛損傷絕。頭目眩。骨節煩痛。飲食微少。羸瘦百病者。

有虛勞腎氣不足。腰痛。陰寒。小便數。囊冷濕。尿有餘瀝。精自出。陰痿不起。忽忽悲喜者。

有五勞七傷六極。強力行事舉重。重病後。骨髓未滿。而行房室。所食不消。胃氣不平者。

有五勞七傷。每事不如意者。

有陰下濕癢。汗出。或生瘡。莖中痛者。

有溺血者。

有膀胱冷。欬唾有血。喉鳴喘息者。

有膀胱腎冷。坐起欲倒。目眩眩。氣不足。骨痿者。

有膀胱寒。小便數。漏精稠厚如白米泔者。

有胞屈僻。津液不通者。

有尿白濁者。

有胞轉者。

有上焦熱。腹滿而不欲飲食。或食先吐而後下。肘攣痛者。

有上焦飲食下胃。汗出面背。身中皆發熱者。

有上焦冷下痢。腹內不安。食好注下者。

有上焦閉塞。乾嘔。嘔而不出。熱少冷多。好吐白沫。青涎吞酸者。

有中焦實熱閉塞。上下不通。隔絕關格。不吐不下。腹滿澎澎喘急者。

有中焦熱。水穀下痢者。

有中焦寒。洞泄下痢。或因霍亂後。瀉黃白無度。腹中虛痛者。

有下焦熱。大小便不通者。

有下焦熱。或下痢濃血。煩悶恍惚者。

有下焦熱毒痢。魚腦雜痢。赤白臍下小腹絞痛。不可忍。欲痢不出者。

有膀胱三焦津液不下。大小腸中寒熱。赤白泄痢。及腰脊痛。小便不利。及婦人帶下者。有下焦虛寒。津液不止。短氣欲絕者。

有下焦虛寒損。或見血後便轉。此爲亡血。或利或不利。

有下焦虛寒損。或先便轉。後見血。此爲遠血。或利或不利。好因勞冷而發者。

有三焦虛損。或上下發泄吐唾血。皆從三焦起。或熱損發。或因酒發者。

有手足厥冷脈絕者。

有下焦虛寒損。腹中瘀血。令人喜恚。不欲聞人語。胸中噎塞而短氣者。

有吐下汗出。而小便復利。或下利清穀。裏外熱。脈微欲絕。或發熱惡寒者。

凡霍亂。務在溫和將息。若冷則遍體轉筋。此病定一日不食爲佳。仍須三日。少少喫粥。三日已後。可依常食息。七日勿雜食爲佳。所以養脾氣也。

有霍亂吐下脹滿。食不消。心腹痛者。

有霍亂吐利止。而身體痛不休者。

有霍亂轉筋。血冷。汗出嘔啘者。

有霍亂吐利已斷。汗出而厥。四肢拘急不解。脈微欲絕者。

有霍亂已服理中四順。熱不解者。

有婦人霍亂嘔逆。吐涎沫者。愼不可下。

有年老霍亂。羸劣。冷柔。惡心。食飲不化。心脹虛滿。拘急短氣。嘔逆。四肢厥冷。心煩氣悶而須汗者。

有毒冷霍亂。吐利煩嘔。轉筋。肉冷。汗出。手足指腫。喘息。唾死絕。語音不出者。

有霍亂蠱。宿食不消積冷。心腹煩滿鬼氣者。

有霍亂洞下不止者。

有霍亂引飲。飲輒乾嘔者。

有先服石人。因霍亂吐下。服諸熱藥。吐不得止。因卽變虛。心煩。手足熱。口乾燥。欲得水。嘔逆迷悶。脈急數者。

有時行熱病後。毒未盡。因霍亂吐下。仍發熱。心胸欲裂者。

有霍亂皆因飲食。非關鬼神。因飽食肫膾。復粲乳酪。海陸百品無所不噉。眠臥冷席。多飲寒漿。胃中諸食結而不消所致。思謂此說止爲貴者言。若貧下此症。亦以瓜李生冷不愼致然。

霍亂人。忌與米飲。胃中得米。卽吐不止。但與厚朴葛根飲。若冬瓜葉飲但沾漬咽喉。而不可多與。若服湯時。隨服吐者。俟吐定乃止。診脈絕不通。以桂合葛根爲吐下。心煩肉熱。汗不出。不轉筋。脈急數者。可犀角合葛根爲飲。吐下不止。發熱心煩。欲飲水。可少飲米粉汁爲佳。若不止。可與葛根薺苨飲服之。

婦人霍亂嘔吐者。

霍亂四逆。吐少嘔多者。

霍亂久。將遠行預備者。

霍亂。永不發丸者。

中熱霍亂。暴利心煩。脈數。欲得冷水者。

陰陽二氣擁而反戾。陽氣欲升。陰氣欲降。陰陽乖隔。變成吐利。頭痛如破。百節如解。遍體諸筋皆爲回轉。論症雖小。卒病之中最爲可畏。雖臨深履危。不足以喻之。

人生放恣者衆。盛壯之時不自愼惜。快情縱慾。極意房中。稍至年長。腎氣虛竭。百病滋生。時服石散。眞氣既盡。石氣孤立。惟有虛耗。唇口乾焦。精液自洩。或小便赤黃。大便乾實。所食之物。皆化作小便。此皆由房

室不節之所致也。

熱結中焦則爲堅。

下焦熱則爲溺血。令人淋閉不通。

氣淋之爲病。溺難。澀。常有餘瀝。

石淋之爲病。痙中痛。溺不得出。

膏淋之爲病。尿似膏自出。

勞淋之爲病。勞倦卽發。痛。引氣衝下。

熱淋之爲病。熱卽發。甚則尿血。

下焦結熱。小便赤黃不利。數起出少。痙痛。或血出。溫病後餘熱。及霍亂後當風。取熱。過度。飲酒房勞。及行步冒熱冷飲。逐熱。熱結下焦作淋。及散石熱動。關格。小腹堅。胞脹如斗。諸有此淋。悉治之立驗。

錄忌如左

喪孝。　產乳。　音樂。　一切魚。　一切肉。

諠戲。　房室。　酢滑。　生冷。　蒜。

粘食。　米豆。　油膩。

右並忌不得食及不得用心其不禁者並具本方之下再發若不爾若雖差復發復發不可治

婦人產後飲水不卽消三焦決漏小便不利仍相結漸漸生聚遂流諸經絡故也

忌腹上出水出水者一月死大忌之

第一唇黑傷肝

第二缺盆平傷心

第三臍出傷脾

第四背平傷肺

第五足下平滿傷腎熱結爲淋者

人氣急積久不差成水病者

有患水腫細腹堅如石小勞苦足脛腫小飲食便氣急此終身疾不差服丹參亦可愈

酒客有虛熱當風飲冷水腹腫陰復脹滿者

水病有通身洪腫者流腫者百藥治不差而欲死者有大腫眼合不欲開短氣欲絕者

男子女人新久腫得暴風入腹者

婦人新產上廁風入臟腹中如馬鞭者噓吸短氣欬嗽者

耆婆萬病丸

牛黃　麝香　犀角一方云一銖今各一分　桑白皮　茯苓　乾薑　桂心　當歸　芎藭　芍藥　甘遂　黃芩　蜀椒　細辛　桔梗　巴豆　前胡　紫菀　蒲黃　葶藶　防風各一分　蜈蚣三節　石蜥蜴　人參一寸　朱砂　雄黃　黃連　大戟　芫花　禹餘糧　芫青七枚

右三十一味並令精細牛黃麝香犀角朱砂雄黃禹餘糧巴豆別研餘者合搗重絹下篩以白蜜和更搗三千杵密封下破除日平旦空腹酒服三丸如梧子大取微下三升惡水爲良若卒暴病不拘平旦早晚皆可服但以吐利爲度若不吐利更加一丸或至三丸五丸須吐利爲度不得限丸數病強藥少即不吐利更非他故若其發遲以熱飲汁投之若吐利不止即以醋飯三兩口止之服藥忌陳臭生冷醋滑粘食大蒜猪雞魚狗牛馬驢肉白酒行房七日外始得一日服二日補之得食新米韭骨汁作羹粥臛食之三四頓大良亦不得全飽產婦勿服吐利以後常須閉口少語于無風處温牀暖室將息若旅行卒暴無飲以小水送之爲佳若一歲以下小兒有疾者令乳母服兩小豆亦以吐利爲度近病及卒病皆用多積久疾病即少服常取微溏利爲度崔氏無黃芩桑白皮桔梗防風爲二十七味

萬病丸治症開錄如左

卒病欲死

蠱毒吐血腹痛如刺。
卒中惡口噤
五疰鬼刺客忤
猫鬼□□□
瘧病未發前一日
諸有痰飲
患冷癖
宿食不消
癥瘕積聚
拘急。心腹脹滿。心痛。
上氣喘逆。胸滿不得臥。
傷寒時行
大痢
疳濕

水病

頭痛惡寒

小便不通

大便不通

耳聾聤耳

鼻衄

癰腫

疔腫

犯疔腫血出

胸背腰脇腫

癩瘡用萬病丸傅之。

瘻瘡

痔瘡

冷瘧積年不差者.

癬瘡

惡刺

蝮蛇螫

蝎螫

蜂螫

婦人諸疾胎衣不下。

小兒客忤

小兒驚癎

小兒乳不消心腹脹滿。

仙人玉壺丸

雄黃。 藜蘆。 丹砂。 礜石。一作礬石。 巴豆。 八角附子。各二兩。

右六味。先搗巴豆三千杵。次內礜石。又搗三千杵。次內藜蘆。三千杵。次內附子。三千杵。次內雄黃。三千杵。次內丹砂。三千杵。內蜜。又搗萬杵。若不用丹砂。內珍珠四兩。無在每內藥。輒治五百杵。內少蜜。恐藥飛揚。治藥用王相吉日良時。童子齋戒。爲良。天晴明。日無雲霧。白晝藥成。封密器中。勿泄氣。着清潔處。大人服

丸如小豆。欲下病者。宿勿食。平旦服二丸。不知者。以粥飲發之。令下。下不止。飲冷水以止之。病在膈上。吐膈下利。或但噫氣卽已。若欲漸除。及將服消病者。如麻子大三丸。卒中惡欲死。不知人。以酒若湯和二丸。強開口灌喉中。鬼疰病百種不可名。漿水服二丸。日再。

玉壺丸治症開錄如左。

男女與鬼交通。歌哭無常。

腹中若有蟲欲鑽脇出狀。急痛一止一作。

憂悲氣結在胸。心若連噫。及欬。胸中刺痛。

心腹切痛。及心中熱。

癖飲。痰飲。

諸疝

卒上氣。氣但出不入。幷逆氣衝喉。胃中暴積聚。

癥結。堅痞。

積寒。熱痞。

食肉不消。腹堅脹。

腹中三蟲

下痢重者

卒關格不得大小便欲死

瘧已發未發

卒霍亂心腹痛煩滿吐下手足逆冷并寒熱往來

傷寒敕濇時氣熱病

淋瀝疲瘦百節酸疼

頭卒風腫

癰疽痤瘤瘰癧及欲作瘻

鼠瘻

中水毒

齒痛

耳聾膿血汁出及卒聾

風目赤或瘙視物漠漠淚出爛

中蠱毒吐血腹內如刺

中蛇蝮諸毒

猘犬所咋

狂馬所咋

婦人產後餘疾及月水不通往來不時

婦人胸中苦滯氣氣息不利小腹堅急繞臍絞痛

小兒百病驚癎痞塞及有熱

小兒大腹及中熱惡毒食物不化結成積聚

小兒寒熱頭痛呼熱及吐哯

小兒羸瘦丁奚不能食食不化

欲問人孝省人病先服之及繫頭上

頭上繫玉壺丸辟百鬼

獨宿山澤冢墓廟社叢林之中燒一丸百鬼走去以蠟和一丸如彈丸着絳囊繫臂男左女右山精鬼魅皆畏之

千金須知

中慢驚爲陰癇.

緩縱爲痱.

淋爲癃.

黃爲痺.

強直爲痓.

喘嗽爲欬逆.

隔氣爲膏盲.

熱死爲暍.

怔忡爲悸.

利爲滯下.

臟毒爲痢之蠱毒.

腸風爲腸滯下血.

咳逆爲噦逆.

服金石藥爲服石。

度者量也。

漬者浸也。

和者調也。

傅者塗也。

暴者曝也。

㕮咀者秤畢細切也。

三兩者今之一兩。

三升者今之一升。

方寸匕者正方一寸散子以不落爲度。

錢匕者五銖銅錢上全抄也。

錢五匕者今五銖錢邊五字者以抄之令不落爲度。

半錢匕者一錢抄取一邊。

梧桐子大者以二大豆準之。

刀圭者。如梧桐子大。

一撮者。四刀圭。

如彈丸。如雞子者。十梧桐子準之。

一升者。取平升爲正。

一把者二兩。

草一束者三兩。

桂　尺者。削去皮半兩。

甘草一尺者。二兩。

蜜一斤者。有七合。

猪膏一斤者。二升二合。

半夏一升者。洗畢五兩。

椒一升者。三兩。

吳茱萸一升者。五兩。

兎絲子一升者。九兩。

蕤間子一升者四兩。
蛇牀子一升者三兩半。
地膚子一升者四兩。
巴豆以枚計者去皮心二分準豆六枚。
附子烏頭以枚計者去皮半兩準二枚。
枳實以枚計者去穰二分準二枚。
棗三枚準一兩。
生薑一累半兩。

此書初得華州石刻。舛譌最多。繼得華州木刻。及蜀中。及郭武定木刻。其譌猶華之石刻也。其門類錯亂者。茲皆類明。拾遺一段。茲皆附之各類。小兒兩類。併而爲一。爲其便于檢閱也。其間有字句之謬。可以意會者。乃敢更之。中有文字高古不能讀者。不敢輒易。乃仍舊焉。自千金論起。至若有所舉重段止。似欲人知所避忌也。自五勞七傷有小腹急痛起。至婦人新產上廁段止。既無治法。又無令人避忌之意。自五勞段。數至第二十二段。中有凡是病者。皆須服之之句。後淋閉論末。又云悉服之立驗。或亦萬病玉壺。各有所主也。因併及之。

委官李海立　生員謝沾書　祿祁鄒鳳皐刻

王雲五主編

叢書集成初編

千金寶要

中華民國二十六年六月初版

編集者　孫思邈

發行人　王雲五　上海河南路

印刷所　商務印書館　上海河南路

發行所　商務印書館　上海及各埠

張

E九三五

十二